


JAMES SCHALLER, MD & KIMBERLY MOUNTJOY, MS

HERBS AND ESSENTIAL OILS

FOR KILLING LYME, BABESIA,
AND BARTONELLA



Author of 15 Books on Lyme, Babesia, Bartonella, Biofilms, and Mold
Free at personalconsult.com



HERBS AND ESSENTIAL OILS

FOR KILLING LYME, BABESIA,
AND BARTONELLA



This easy to read book uses the most up-to-date medical knowledge, and is written by Dr. James Schaller and his research partner, Kimberly Mountjoy, M.S., who have co-authored 8 books together. Dr. Schaller is the author of 15 books on Lyme disease, Babesia, Bartonella, Biofilms, and Mold, most of which are available for free download at personalconsult.com. He is also the author of the definitive texts on Artemisia, Babesia, and Biofilms, as well as many other books and research papers. He is a research physician with 30 years of experience successfully treating Lyme disease, Babesia, Bartonella, and Mold in his family and patients using both Western and non-traditional medicine treatment options.

Kimberly Mountjoy, Dr. James Schaller research and patient care partner, has a Master's degree in Physical Organic Chemistry, with extensive education in Cell and Molecular Biology, Plastics Engineering, and Electrical and Computer Engineering. She has published 12 research papers.

Bİ TKİ LER VE
UÇUCU YAĞ LAR
LYME'I ÖLDÜRMEK İ Çİ N,
BABESİ A VE
BARTONELLA

James L. Schaller, MD, MAR

Kimberly Mountjoy, MS

Telif hakkı © 2023 James Schaller, MD, MAR ve
Kimberly Mountjoy, MS

Her hakkı saklıdır.

Uluslararası Bulaşıcı Hastalık Basını
Banka Kulesi • Newgate Merkezi (Süt 305)
5150 Tamiami Yolu Kuzey [Otoyol 41]
Napoli, Florida 34103

Kimberly Mountjoy, MS'ye

Şaşırtıcı Bilim Adamı ,

Sürekli Nazik,

Derin Hıristiyan

Teşekkür Stephen H.

Buhner Her şey için

teşekkürler

İ Çİ NDEKİ LER

Lyme Hastalığı , Babesia ve Bartonella için Neden
Doğ al Tedaviler

Kullanı lmalı dı r?1

Neden Bu Bitkisel Seç enekleri

Tanı talı m?5 Örnek Lyme, Babesia ve Bartonella B

Üç ünüde Ödüren Otlar: Lyme , Babesia ve
Bartonella9

Güzel haberler11

Cryptolepis sanguinolenta13

Japon Knotweed (Polygonum cuspidatum).... ...15

Andrographis (Andrographis panikulata).....17

Houttuynia cordata21

Kedi Penç esi (Samento veya Uncaria tomentosa).....23

Otoba parvifolia (Banderol)25

Artemisia, Artesunate ve Artemisinin.....27 IV

veya Kas Enjekte Edilen Artesunat.....31 Sarı msak

ve Sentetik Sarı msak.....35 Siyah

Ceviz (Juglans nigra).....39

Alchornea cordifolia	41	Temel
Lyme, Babesia ve Bartonella'ya Karşı Kullanılan Yağ lar	43	
Çin takkesi (Scutellaria baicalensis veya Calvaria).....	49	Cistus
incanus (veya Cistus creticus).....	51	
Şaka	53	
Bitkilerle “Herx” Reaksiyonları nı Düşürmek.....	55	
Klorella.....	57	
Karahindiba kökü.....	59	
Modifiye Narenciye Pektini	61	
Optifiber Yalı n	63	Japon
Knotweed.....	65	
Esrar Türevleri.....	67	
Quercetin.....	69	
Son notlar.....	71	
Kaynakça	85	

Lyme Hastalığı , Babesia ve Bartonella için Neden Doğal Tedaviler Kullanılmalı mıdır?

Birincisi, bunlar ciddi rahatsızlıklara neden olabilecek ve işleyişinizi engelleyebilecek çok acı masız enfeksiyonlar olabilir. Yani her seçeneğe sahip olmak akıllıcadır.

Bu enfeksiyonlar, rutin sentetik antibiyotiklerden sonra hayatta kalabilen kalıcı hücrelere sahiptir. Lyme hastalığı durumunda, olağan spiral şekilli bakteriler, reçeteli ilaçlara direnen koruyucu yuvarlak gövdelere dönüşebilir.

Lyme ve Bartonella gibi enfeksiyonların çoğu, tipik antibiyotiklerin nüfuz etmekte zorlandığı sümüksübir biyofilmin arkasında yaşar. Babesia uzmanı ve arkadaşı Dr. Henry Lindner'e göre Babesia aynı zamanda "yuvalarda" yaşıyor ve bu da rutin kan testlerinde görülmesini zorlaştırıyor.

JAMES SCHALLER, MD, MAR ve KIMBERLY MOUNTJOY, MS

Sentetik antibiyotikler bakterilerin antibiyotiğı i yenmesini kolaylaştı ran tek bir kimyasaldan oluşur. Buna “direnç” diyoruz.

Ancak şıfalı bitkiler birden fazla öldürücümaddeye sahip olma eğ ilimindedir. Ve birden fazla bitkisel antibiyotiğı i aynı anda yenmek zordur - her birinde 1-3 antibiyotik kimyasal bulunabilir - bu büyük bir iyileştirme gücüdür.

Örneğ in, *Uncaria tomentosa* (Kedi Penç esi), çok düşük bir konsantrasyonda, Lyme biyofilminde (biyofilmlere nüfuz edemedikleri için antibiyotiklerin başarı sı z olması na neden olan sümüksütabaka) önemli ölç üde azalma gösterdi. Ancak *Uncaria* Lyme bakterilerini öldürmez. Ancak *Otoba parvifolia* (Banderol) eklenmesi

Ekstrakt bakterilerin yüzde 90'ı ndan fazlası nı öldürürken biyofilmler üzerinde hiç bir etkisi olmadı . Basitçe, kritik bir gerçeğ i peşinen paylaşmama izin verin. Lyme, Babesia ve Bartonella'nı n tedavisi farklı benzersiz tedaviler gerektirir ve şıfalı bitkiler veya sentetik ilaç lar kullanı yorsanı z her zaman birden fazla tedaviye ihtiyacı nı z olacaktı r. Başarı ya ulaşmak için tı bbi kombinasyon tedavisine ihtiyacı nı z var.

Naturopatik doktor (ND) bitkisel ürünlerine bakarsanı z, bunları n genellikle sı vı tentür veya kapsül içinde birden fazla madde içerdiğ ini fark edersiniz.

Bitkisel ve uçucu yağ tedavisinin bir sı nı rlaması , bunları n kullanı mı na ilişkin araştı rmaları n sı nı rlı olması dı r. Bitkilerin bakteri olarak kullanı mı na ilişkin temel çalı şmaları n çoğ u

LYME, BABESIA VE BARTONELLA'YI ÖLDÜRMEK İÇİN BİTKİLER VE ESAS YAĞLAR

Katiller yalnızca laboratuvardaki test tüpü bulgularıdır. İnsanlarda ve hatta farelerde çok az test var. Ancak hepsi yüzlerce, hatta binlerce yıldır kullanılmaktadır. Çocukları mı, karı mı, hastaları mı, arkadaşları mı ve kendimi iyileştirmeye yardımcı olmak için 29 yıldır reçete yazdım.

Çoğu ileri düzey doktor, belirli bir hastalık için sınırlı araştırmaları olan sentetik ilaçları rutin olarak kullanır. Örneğin, Monica Embers, yaygın olarak kullanılan ve yeni ortaya çıkan sentetik ilaçları n Bartonella'ya karşı etkisini laboratuvarda yayınladı; insanlarda, hatta sıçanlarda veya farelerde değil.1 Yararlı dersler, ancak sınırlıdır.

Bu nedenle, hem doğ al hem de geleneksel tıpta test tüpündeki bulguları doğrulamak için sıklıkla insan denemelerine ihtiyaç duyulur.

Neden Bu Bitkisel Seçenekleri Tanıtmalı Sınırlı?

Basitçe, şifalı bitkiler ve uçucu yağlar hakkında kapsamlı bir ders kitabı yazmıyordum. Bu kısaca olacak ve yalnızca ana fikri verecektir, aksi takdirde çok az okuyucu bitirecektir. Ve Lyme, Babesia ve Bartonella için önerilen bitkisel tedavilerin çoğunun çok az yaygını var. Yani bu küçük kitap bir ihtiyacı karşılıyor.

Bir trend olarak bitkisel tedavilerin orta ila düşük yan etkileri vardı, ancak hepsi hamilelik sırasında önerilmez. Hamileyseniz veya hamile kalmaya çalışıyorsanız, kullanmadan önce herhangi bir bitki hakkında naturopatik bir doktora danışın.

Bu kene veya pire enfeksiyonlarını tamamen tedavi etmek zor olabileceğinden şifacıların mantıklı olan her tedavi seçeneğine ihtiyacı vardı.

Çoğu bitkinin ortak basit bir adı ve teknik adı olduğunu lütfen unutmayı. Bu profesyonel adı ekledim çünkü bazı kitaplar, mağazalar ve araştırmacı makaleleri teknik adı kullanıyor.

JAMES SCHALLER, MD, MAR ve KIMBERLY MOUNTJOY, MS

Sadece en iyi dođ al seęenekleri tartı şacađ ı m, bu yüzden öđ renilecek şifalı otları n listesi küç ük olacak. Ve bu kitap açı kken bunları kolayca kendiniz sipariş edebilirsiniz. Bir Herbal Lyme uzmanı nı n veya naturopatik bir doktorun rehberliđ ine sahip olmak satı n almayı kolaylaştı rabilir. Yani bir bitki Japon knotweed'i veya Polygonum cuspi datum olarak listelenebilir . İ kisini de kullanacađ ı m.

Örnek Lyme, Babesia ve Bartonella Bitkisel Tedaviler

Feng ve Zhang, bir test tüpüç alı şması nda bazı doğ al tedavilerin Lyme'ı öldürme konusunda iyi bir yeteneğ e sahip olduğ unu gösterdi. muhtemelen doksisiklin ve sefuroksimden (IV Rocephin) daha üstündür.2 Gerçekten de, bu araştı rmacı lar sadece %1 etki gücüne sahip yedi bitki ekstraktı nı n Lyme'ı etkili bir şekilde öldürdüğ ünü bulmuşlardı r. Bu güç lütedaviler şunlardı :

Polygonum cuspidatum kökü(Japon knotweed)

Uncaria tomentosa (Kedi Penç esi veya Samento)

Cryptolepis sanguinolenta

Scutellaria baicalensis (Çin takkesi)

Artemisia annua (Tatlı pelin)

Juglans nigra (Siyah ceviz)

JAMES SCHALLER, MD, MAR ve KIMBERLY MOUNTJOY, MS

Zhang, Babesia'ya müdahale eden beş bitki buldu . 3
Bunlar:

Cryptolepis sanguinolenta

Artemisia annua (Tatlı pelin)

Scutellaria baicalensis (Çin takkesi)

Alchornea cordifolia

Polygonum cuspidatum (Japon knotweed)4

Son olarak Bartonella'yı görmezden gelemeyiz .

Lyme hastalığı ı ndan daha yaygın olabilir ve

Bartonella yüzlerce tıbbi ve psikiyatrik soruna neden olabilir.

Bartonella birçok böcek türü tarafından taşınır.

sadece tikler değil. Bartonella bakterilerini öldüren şifalı bitkiler
şunları içerir:

Cryptolepis sanguinolenta

Juglans nigra (Siyah ceviz)

Polygonum cuspidatum (Japon knotweed)

Herkesi Öldüren Otlar

Üç ü Lyme, Babesia ve Bartonella

Y. Zhang, en az dört bitkinin Lyme, Babesia ve Bartonella'yı öldürdüğünü buldu.

(*Cryptolepis sanguinolenta*) - Sağlıklı Markaya Dönüş

Siyah ceviz (*Juglans nigra*) - Horbaach Markası

Japon knotweed (*Polygonum cuspidatum*) -
Saflık Laboratuvarları Trans-resveratrol

Çin takkesi (*Scutellaria baicalensis*) -
Horbaach Markası

Güzel haberler

Eğer test tüpüç alı şmaları güvenilirse, Lyme, Babesia ve Bartonella'yı yenebilecek bir dizi doğ al tedavi var gibi görünüyor . En az yüzlerce yıl boyunca dünya çapı nda bir milyon insanı n bu şifalı otları n her birini denemiş olması beni şaşı rtmaz.

Son olarak bitki reç etesi yazarları n birden fazla bitki kullanmayı sevdiklerini bilmelisiniz. Bu avantaj, 1 artı 1 artı 1'in 10'a eşit olması gibidir.

Şimdi körükörüne kullanmadan önce bu kazanan bitkilere bakalı m.

Cryptolepis sanguinolenta

Cryptolepis muhteşem. Antibiyotik, antiviral, antifungal ve antiparaziter bir tedavidir.5 Hatta sizin için kurabiye bile pişirir.

Ancak her iki cinsiyette de doğurganlığı azaltabilir. Hamile kalmaya çalışsan hastalarda kullanılmamalıdır.6 Bu nedenle bazı şifacılar bunu yalnızca kısa süreliğine kullanırlar.

Benim fikrim, hamile kalmaya çalışıyorsanız veya hamileyseniz bir bitkisel ilaç uzmanına danışmanızı akıllıca olacaktır.

Bu hem erkekler hem de kadınlar için geçerli olabilir.

2021'de Dr. Y. Zhang, Cryptolepis sanguinolenta ekstraktını yalnızca %1'lik zayıf etkisinin Lyme'ı tamamen ortadan kaldırmamasına neden olduğunu şaşırtıcı bir şekilde gösteren test tüpü çalışmaları yaptı.3 Diğer şifalı bitkiler ve iki geleneksel antibiyotik in Lyme'a karşı bu kadar güçlü olmadıkları ortaya çıktı. Üç hafta sonra Lyme bakterileri hâlâ görülebiliyordu.2

Son olarak Cryptolepis'in hoş olmayan bir tadı vardır. Bu yüzden hastaları m gliserinli sıvı veya kapsül şeklinde tercih ediyor. Taze olanları istediğiniz için kapsüllerin üzerindeki tarihi kontrol ettiğinizden emin olun.

Japon Knotweed'i (*Polygonum cuspidatum*)

Japon knotweed'i beyindeki ve kalpteki Lyme'ı tedavi edecek kadar güçlüdür. "Öüm" veya Herx reaksiyonları nı azaltabilir. "Herx" (Herxheimer reaksiyonu), etkili bir bitkinin bir enfeksiyonu öldürmesi ve ortaya çı kan kalıntı nı n güçlü bir vücut iltihabı na ve kendini kötü hissettiren güçlü bir bağ ı şı klı k tepkisine yol açması sonucu ortaya çı kan rahatsızlı ı . Şaşı rtıcı bir şekilde, Japon knotweed'i enfeksiyonlardan kaynaklanan aş ı rı iltihaplanmanın bir kısmı nı engeller. "Sitokinler" adı verilen bazı inflamatuvar kimyasalları durdurur. Knotweed, MMP-1 ve MMP-3.7'yi bloke eden tek bitkidir.

Japon knotweed'i beyin sinirlerini korur. Ayrıca resveratrol, özellikle enfeksiyonları nı zı ortadan kald ı rmak için en kullan ı şlı kı sı m olan trans-resveratrol içerir . Resveratrol saf standardize edilmiştir Japon knotweed'i. Buhner üzümlerden resveratrol kullan ı lmaması nı öneriyor.

JAMES SCHALLER, MD, MAR ve KIMBERLY MOUNTJOY, MS

En iyi bitki uzmanı Stephen Buhner, bu bitkinin hem Lyme hem de Bartonella'yı tedavi etmek için kullanılması nı öneriyor. Bartonella'sı nda _ ders kitabı nda ayrı ca Japon knotweed'in Bartonella'nı n da yaptı ğ ı gibi kan damarları nı zı n hassas yüzeyini koruduğ unu söylüyor. aç ı kça enfekte eder.8 Zhang, Lyme ve Bartonella'nı n büyüyen ve kalı cı durumları nı tedavi ettiğ ini göstermiştir . 9 Bu çok önemli, ancak yalnızca kalı cı hücrelerin gücünü anlarsanız. Nükleer bombadan sonra sadece hamamböceklerinin hayatta kalacağı söylendi. Antibiyotikler Lyme ve Bartonella bakterilerinin çoğ unu yok ettikten sonra hepsi yok olmuş sayılmaz. Lyme ve Bartonella'nı n ı srarcı ları varlığı nı sürdürüyor. Ve Japon knotweed'i onları yenmeye yardımcı oluyor.

Bu heyecan verici çünkü bazı insanlar inatçı ı srarlar nedeniyle hastalı ğ ı nüksetmeye başlı yor.10, 11

Bir yetişkin için tipik doz, üç gün boyunca günde iki kez 200 mg'dır ve günde iki veya üç kez 800 mg'lık bir üst doza ulaşmak için her iki günde bir artır ı lı r (Dr. Bill Rawls'dan değ iş tirilmiştir).15 Stephen Buhner üç kişilik bir tentür önerir . 1 çay kaş ı ğ ı farklı enfeksiyonlar. Günde 3 ila 6 kez. Bartonella kitabı nda günde 3 defa bir kapsül önermektedir (Green Dragon Botanicals).10

Andrografi (Andrografis panikulata)

Andrographis grip, COVID 19 ve Hepatit B ve C gibi birçok virüsü tedavi eder. Ayrıca E. coli gibi sert bakterileri de öldürür.

Şaşırtıcı bir şekilde yuvarlak solucanları ve tenyaları da öldürür. H. Zhang , anti-tümör, anti-bakteriyel, anti-inflamasyon, anti-virüs, anti-fibroz, anti-obezite aktivitesine sahip olduğunu ve Okhuarobo'ya göre sıtma ve protozoaları da öldürdüğünü (bunlar tek hücreli parazitlerdir) bildirmektedir. Babesia gibi . 12, 13

Okhuarobo, güvenlikle ilgili tüm önemli araştırmaları gözden geçirdi ve şu sonuca vardı : Bu bitkiden izole edilen ekstraktları n ve metabolitlerin sayı sı z toksisite değ erlendirmesinin sonuçları , deney hayvanları nda herhangi bir önemli akut toksisite göstermedi.¹³

Buhner, Lyme'ı İ yileştirmek adlı kitabı nda andro grafolidin bu enfeksiyona yakalanan hastaları n %60'ı nda Lyme'a karşı etkili olduğunu bildirmektedir.¹⁴

JAMES SCHALLER, MD, MAR ve KIMBERLY MOUNTJOY, MS

Rawls , yetişkinlerde Andrographis'in %10-30'a standardize edilmiş bir ekstrakt olarak 200 ila 800 mg oranı nda

Andrographis için kullandığı bir dozla başlamaktadır. 15

Üç gün ve sonra günde iki kez alını. Tang, insanlarda yapı lan bir çalışmada ülseratif koliti tedavi etmek için ekstrenin günlük 600 ila 1.800 mg dozunu bildirmiştir.16 Bazen bir içerik maddesi "%10 Andrographolides" olarak listelenir.

Andrographolides bu bitkideki etkili bitkisel kimyasaldır. Buhner, bir hafta boyunca günde 3 kez 600 mg kapsül öneriyor ve tolere edilirse günde 3 kez 1200 mg'a çıkılması nı öneriyor. Diğer doğal tedavilere göre daha fazla yan etkiye sahip olma eğilimindedir.14

Son olarak, Radiance laboratuvarları nda (LH 14) ve National Jewish Health'de (yalnızca TH1/TH2 Panel A) iltihaplanma laboratuvarları yaptı rı yorsanız , doktorunuz sizi perişan eden iltihap kimyasalları nı takip edebilir. Ulusal Yahudi Sağ lı ğ ı web sitesi bu paneli açık ça göstermiyor;

doktorunuzun bir hesap oluşturmaları gerekecek. Laboratuvarında Sandborn, Andrographis'in TNF- α , IL-1 β ve NF- κ B'yi düşürdüğ ünü buldu. Sitokinleri veya inflamasyonu tam olarak hedefleme yeteneğ i heyecan vericidir.17

LYME, BABESIA VE BARTONELLA'YI ÖLDÜRMEK İÇİN BİTKİLER VE ESAS YAĞLAR

Tadı çok acı olduğu için bazı uygulayıcılar onu kapsüllere koymayı öneriyor.

Tayland'da yapılan bir araştırmada görülen tek yan etki; bağışıklık sistemi hücrelerinin artması, alkalik fosfatazın azalması, idrar pH'sında artış ve kan basıncında kısa süreli bir düşüş oldu.18 Hiç kimse ciddi yan etkiler yaşamadı.

Houttuynia kordatası

Yaklaşık on sekiz yıl önce Amerika'nın önünde gelen Çinli bitki uzmanı yla tanıştı m ve arkadaş oldum.

Dr.QingCai Zhang. Philadelphia'daki ilk toplantı mı zı n ardı ndan QingCai, bitkilerinin yüksek saflı ğ ı nı ve kapsamlı kalite testlerini tartı şmak için Napoli, Florida'ya uçtu. Daha sonra, araları nda HH veya Houttuynia cordata'nı n da bulunduğ u iki şifalı bitkinin etkinliğ i üzerine kendi fonumla yaptı ğ ı m araştı rmayı dinledi . Basitçe, günde üç HH'nin çoğ u Bartonella'yı öldürecek kadar güçlüolmadı ğ ı nı buldum . Böylece Dr. Zhang, gücükiye katladı ve buna HH2 adı nı verdi. Bası n açış klaması nda şunları söyledi: "Dr. James Schaller klinik gözlemler yaptı ve daha yüksek dozajla terapötik etkinliğ in arttı ğ ı nı buldu. Çift güçlübir versiyon üretmemizi önerdi... Artı k çift güçlüHH2 Kapsülü[mevcut.]"

Son on beş yıl daki araştı rmam, bu bitkinin Bartonella'yı engellemede ve Bartonella bakterilerinin sayısı nı azaltmada etkili olduğ unu ileri sürdü. Ancak genel olarak herhangi bir dozda tedavi edici olduğ una inanmı yorum, çünkü

JAMES SCHALLER, MD, MAR ve KIMBERLY MOUNTJOY, MS

bir yıl boyunca çok yüksek dozlarda hala Bartonella'yı görebilirsiniz kan lekesinde.

Şu anda bunu Zhang Clinic NYC'den Dr. Zhang'ın oğlu Dr. Yale Zhang'dan satın alabilirsiniz. Artık "HH-M" olarak adlandırılıyor.

Zhang Kliniği
(914) 259-0346

Veya çevrimiçi satın alın
DrRons.com

Olası bir seçenek, Houttuynia esansiyel yağıdır, saf ve güvenli ve güvenlik açısından agresif bir şekilde test edildikten sonra kullanılmaktadır. Her marka saf değildir. Pang'a göre halihazırda birçok antiviral ve antibiyotik amaçlı kullanılmaktadır.¹⁹

Son olarak, Houttuynia'nın tüm mükemmel biyolojik kullanımlarını yanı sıra, hastalığına ve rahatsızlığına muhtemelen katkıda bulunan iltihap kimyasalları da azalttığına lütfen unutmayın. Doktorunuz inflamatuvar sitokinleri ölçmek için Radiance Labs ve National Jewish Health'i kullanıyorsa, TNF- α , IL-1 β , IL-6 ve IL-8'i azaltmak için Houttuynia bitkisini veya esansiyel yağı arayın.²⁰

Özel inflamasyon kimyasalları, sitokinleri, interferonları ve interleukinleri ölçmek için rutin ulusal laboratuvarları kullanırsanız, çok hasta olsanız bile tekrar tekrar yalnızca negatif sonuçlar alırsınız.

Kedi Pençesi (Samento veya Uncaria tomentosa)

Kedi Pençesi binlerce yıldır Amazon halkı tarafından kullanılmaktadır. Bu bitkinin kaynağı iç kök veya asma kabuğudur.

Güçlü anti-inflamatuar faydaları vardır ve aşırı bağırsıklı tepkisini yatıştırır.²¹ Yüksek tansiyon, astım, kanser, diyabet, artrit ve nörodejeneratif hastalıklarda kullanılır. Uncaria'dan 200'den fazla bileşik izole edilmiştir.

Bu bitki doğal şifacılar tarafından Lyme hastalığı için kullanılır. Ancak yalnızca sınırlı araştırmalar bu kullanımı desteklemektedir. On milyonlarca tıbbi çalışmanın bulunduğu PubMed bile Lyme ve Uncaria'ya yalnızca bir tanesinin baktığını gösterdi birlikte, Feng tarafından yazılmıştır.² Zhang ve Feng, Kedi Pençesi'nin Lyme hastalığı tedavisinde en iyi bitkilerden biri olduğunu gösterdi.²¹

Son olarak, hamileyseniz kullanmayı ve bazı kişilerin mide bulantısı, karı n spazmı ve ishal yaşadığını unutmayı n.

JAMES SCHALLER, MD, MAR ve KIMBERLY MOUNTJOY, MS

Yetişkin dozu, %3 alkaloidlerle standartlaştırılmış 400 ila 800 mg iç kabuk veya iç kabuğun 10:1

konsantrasyonudur (Rawls).¹⁵ Buhner, %60 alkolde 1:5

konsantrasyonun 1-3 oranında alınması yaklaşık 50

damla olması önerilir. günde bir doz. Rawls'a göre

yemekle birlikte alınmalıdır çünkü mide asidi işe yaramaktadır

Otoba parvifolia (Bandrol)

Lyme, Babesia ve Bartonella ile ilgili yakı n zamanda yapı lan bir konferansta bazı doktorlar Banderol'ün başarı lı bir şekilde kullanı ldı ğ ı nı bildirdi. Yı llar önce bu bitki üzerinde kendi kendime finanse edilen bir araştı rma yapmı ştı m. Bir sonuca varamadı m. Ve PubMed'de bu alı ntı yla ilgili çok az şey vardı . Bununla birlikte, Otaba parvifo lia (Banderol) ile Uncaria tomentosa (Kedi Pençesi) kombinasyonunun Lyme'ı öldürme yeteneğ i laboratuvar ortamı nda Bu iki bitkiden elde edilen ekstraktları n Borrelia burgdorferi'nin (bir Lyme türü) aktif ve hareketsiz formları üzerindeki etkinlikleri test edildi ve özellikle kombinasyon halinde kullanı ldı ğ ı nda tüm formları üzerinde önemli etkiler ortaya çı ktı . 23

Artemisia, Artesunate ve Artemisinin

Bu şifalı bitkiler ailesi hakkında gerçekten bilgi edinmek istiyorsanız lütfen kişisel danışmanlıkta sunulan ücretsiz kitabıma bakın. com. Amazon.com'da bu konuyla ilgili 1 numaralı kitaptır.24

Benim endişelerimden biri, bazı doktorların Babesia'yı öldürmek için sade, değ işmemiş Artemisia bitkisini reçete etmeleridir .

2006 yılı lı nda sade Artemisia bitkisinin Babesia'yı öldüremeyecek kadar zayı f olduğ unu bildirmişt im . 24 Elfawal, hem Artemisia annua'nı n hem de Artemisinin'in Babesia'yı öldürmediğ ini buldu . 25

Artemisia annua, binlerce yıld ır parazitleri ve çeşitli enfeksiyonları n neden olduğ u ateşle ilişkili rahatsız lı kları tedavi etmek için kullan ılmaktadı r.25 Pek çok bulaş ıcı ajana karşı etkili olması na rağmen, bitki mucizevi bir tedavi değ ildir ve etkisiz olduğ u veya sı nı rlı değ eri olduğ u kanı tlanmı ş enfeksiyonlar vardı r. Bu başarı sı zlı kları n raporlanması önemlidir.

Örneğ in Artemisia annua, artesunate ve artemisinin , enfekte farelerde Babesia'nı n azalt ılması nda veya ortadan kald ır ılması nda etkisizdi . Bu nedenle, eğ er güç lükullan ı yorsanız

JAMES SCHALLER, MD, MAR ve KIMBERLY MOUNTJOY, MS

yarı sentetik artesunat, yüksek doz almaya çalıştığını ve asla tek bir tedavinin Babesia'nı zı öldüreceğine inanmaydığını.

Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki Artemisia annua uçucu bir yağ ı vardı r.26 Bunlar çok güçlü tedaviler olabilir. Tek endişem, reçetesiz satılan birçok soğuk algınlığı ve grip ilacını içinde bulunan önemli miktarda kafur içermesidir.

Kafur, Vicks inhalatöründe, Tiger balsamı nda, bazı Emu yağ ları nda ve Vicks VapoRub'da bulunur.

Şu anda, bu hafif tedaviye duyarlı olup olmadığınızı görmek için beş gün boyunca günde iki kez 100 mg ile 200 mg arasında iki kapsül artemis ile başlayacağım. Örneğin Lyme, Babesia ve Bartonella'lı pek çok kişi, kendinizi kötü hissetmenize neden olabilecek yaklaşık 1000 kimyasal taşıyan reaktif mast hücreleri geliştirebilir. Tepki verirsiniz, hiçbir değişiklik yapmadan zayıf Artemisia bitkisi kullanırsanız, böylece iltihap kimyasalları yapmak için bağırsıklı sistemini harekete geçiren büyük miktarda Babesia döküntüsünü oluşturmaz. Bununla birlikte, artemisininin 100 mg ile 200 mg dozunu tolere ederseniz, beş gün sonra dozu ikiye katlayarak günde 200 mg ile 400 mg'a çıkarın.

Daha sonra çok daha güçlü olan artesunata geçin.

Bunu www.DrRons.com adresinden satın alın. Araştırmama göre iki kat daha güçlü hale getirilmiş oldukça güçlü bir form sunuyorlar (Q. Zhang). Artık "Arte-M" olarak adlandırılıyor. Ayrıca bazı doktorlar yönetmeyi sever

LYME, BABESIA VE BARTONELLA'YI ÖLDÜRMEK İÇİN BİTKİLER VE ESAS YAĞLAR

kasını za artesunat veya IV yoluyla. Olası bir doz 120 mg'dır.

Arkadaşım Henri Lindner olağanüstü bir Babesia Ben bağımsız olarak Artesunate'in Babesia'yı öldürmenin çok kullanışlı bir yolu olduğunu konusunda karara vardı. Ve öyle görünüyor ki bu, Jansen'e göre artesunate'nin artemisinininden üstün olduğunu yıllar önce kabul edil (Ancak ikimiz de tek bir bitki veya sentetik tedavi kullanmanın Babesia hastalığını tedavi etmeyeceğini inanıyoruz). Bunu 2006'daki altı Babesia kitabımda önerdim, ancak Lindner bu önseziyi büyük bir klinik yaratıcılıkla genişletti ve bunu klinik olarak kanıtladı.

Kafur (%44), germakren D (%16) içeren Artemisia annua esansiyel yağı, antimikrobiyal aktivitesi açısından tarandı. Esansiyel yağ, test edilen gram-pozitif bakterilerin büyümesini dikkate değer bir şekilde inhibe etti.27 Kafur, bir nörotoksin olduğu için düzenli değil, dikkatli kullanılmasıdır.

IV veya Kas Enjeksiyonlu Artesunat

Enjeksiyonluk artesunat, yetişkin ve çocuk hastalarda şiddetli sıtmanın tedavisidir.²⁹

Enjeksiyon için artesunat, 110 mg veya 120 mg, intravenöz uygulamaya yöneliktir. 2022'de CDC ve FDA, şiddetli sıtma vakaları için artesunat'ı IV kullanımı için onayladı ve ER'lerde ve olası sıtma hastaları için bulunduğu diğer yerlerde stoklanması için şiddetle tavsiye etti.³⁰

Neden çok hızlı işe yarayabilecek bir sıtma ilacı ndan bahsediyorum? Band Aid Lyme, LLC'nin kurucusu yakını arkadaşım Valerie Viale Fuller defalarca Babesia'dan neredeyse ölüyordu . Kimse ona IV artesunat vermeyi düşünmedi. Bana göre Babesia'yı öldürmek sıtmayı öldürmekten çok daha zor.

JAMES SCHALLER, MD, MAR ve KIMBERLY MOUNTJOY, MS

Şu anda bir ilaç şirketi IV artesunat'ı n geniş çapta
dağ ı tı lması konusunda agresif davranı yor.
İ şte ana sayfa yorumları :

ABD'de IV kini dinin 2019'un başları nda kesilmesinden
bu yana FDA onaylı enjekte edilebilir sı tma ilacı
bulunmuyor. Enjeksiyon için Artesunate bu ihtiyacı
karşı lı yor.

Distribütörlerimizden ürün temin etmekte zorluk yaşayan
sağ lı k profesyonellerinin aşağı daki Amivas Medikal
İ şler hattı ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

Bu hat 7/24/365 açı ktı r:

AMIVAS MEDİ KAL İ ŞLERİ
1-855-5AMIVAS

Amivas tarafı ndan üretilen enjeksiyonluk Artesunate, FDA
tarafı ndan onaylanmı ştı r ve Amerika Birleşik Devletleri'nde
ticari olarak mevcuttur.

FDA onaylı artesunat büyük ilaç distribütörlerinden satı n
alı nabilir.

CDC, "enjeksiyon için artesunatı n bebeklere, çocuklara,
yetişkinlere ve hamile kadı nlara verilebileceğ ini"
belirtmektedir.31 IV artesunat, transfüzyon gerektiren ciddi

kı rımı zı kan hüresi sorunları na neden olabilir. Bu
nedenle artesunat IV verdikten sonra hastaları n izlenmesini öneriyorla

İntravenöz artesunat aldıktan sonra 7. günden başlayarak 4 haftaya kadar kullanılması tavsiye edilir. https://www.cdc.gov/malaria/new_info/2020/artesunate_onay.htm

Dünyanın büyük bir kısmı Babesia'nın kuzeni sıtımaya karşı Artemisinin bazlı kombinasyon tedavilerini (ACT) kullanıyor. Peki ACT nedir? Artemisia türünün farklı bir sentetik sıtımaya öldürücüyle birleştirilmesidir.

Dünya Sağlık Örgütü bir bitki ile sentetik bir ilacın bir arada kullanılması gerektiğini güçlü bir şekilde destekliyor ve bunlara "artemisinin bazlı kombinasyon tedavileri" adı veriliyor ve şu anda sıtımının yaygın olduğu 50'den fazla ülkede kullanılıyor. Bu nedenle, şifalı otları sentetik sıtımaya ilaçları ile birlikte kullanma konusunda büyük deneyime sahibiz. Babesia tedavilerinin tümü sıtımaya tedavidir.

Bu, bu kitaptan çıkacağı düşünülmüş olası bir derstir. Bitkileri ve esansiyel yağları sentetik eczane ilaçları ile birlikte kullanmak genellikle sıtımının ve aynı zamanda Babesia'nın öldürülmesinde yararlı olabilir. İkinci ölümüne sebep olabilir veya terlemeye, üşümeye, baş ağrısı, na, hava açlığına veya ciddi yorgunluğa neden olabilir.

Öyleyse Price'ın etkili bitki ve ilaç kombinasyonlarını listelediği aşağıdaki özetine bakalım.32

JAMES SCHALLER, MD, MAR ve KIMBERLY MOUNTJOY, MS

Sı tmayı öldürmek için en yaygı n kombinasyonlar şunlardı r:

- artemether-lumefantrin (Coartem)
- artesunat-amodiakin (Şu anda öyle değ il)
ABD veya Birleşik Krallı k'ta mevcuttur, ancak Kanada Sağ lı k Özel Erişim Programı kapsamı nda Kanadalı lar tarafı ndan satı lı nabilir. Bu Kanada sı tma ağ ı yla ilişkilidir. Kanada'daki Kripps eczanesinin en iyi eczacı sı olan yakı n arkadaş ı m Ian, birinin bir ihtiyacı kanı tlaması gerektiğ ini bi
- artesunat-sülfadoksin-pirimetamin (Fansidar).
- artesunat-meflokin (meflokin Larium'dur).
- dihidroartemisinin-piperakin —Janson
dihidroartemisinin asidin çok kararsız olduğ unu ve çok kolay ayrış tı ğ ı nı bildiriyor. Yani gücüne rağmen sı nı rlamaları var.

Babesia ile yaptı ğ ı m görüşmelerden elde edilen fikir birliğ i Bilgili doktorlar, Coartem'in lume fantrin ile kombinasyon ilacı ndaki bitkisel türev arte metrenin çok iyi tolere edildiğ i yönündedir. Bitkisel kı smı sentetik olan artemetherdir. Birçok Lyme okuryazar doktoru, üç gün boyunca günde sekiz tablet reçete ediyor; bu biraz agresif. Şahsen ben hiçbir hastamda Coartem'in herhangi bir dozunda yan etki yaşamadı m.

Sarı msak ve Sentetik Sarı msak

Sarı msak yağ ı Babesia duncani'yi ortadan kaldı rmaya yardımcı olur. Yumin Zhang laboratuvar deneylerinde atovakuon (Mepron) ve azitromisin (Zithromax) ile rutin CDC tedavisinin bazı Babesia'ları öldürdüğü üü ancak 33 ile bu gerçek bazı nüksetmeler tarafı ndan göz ardı edilmiş gibi görünüyor .

Babesia'yı öldürmeye yönelik bu tek tedavi yaklaşımı nı güncelleyemeyen Babesia araştı rmacı ları . Ancak azitromisine (Zithromax) sarı msak yağ ı eklenmesi Babesia'yı herhangi bir nüksetmeden öldürdü Yaklaşık yirmi dokuz yıl dı r sarı msak, sarı msak yağ ı veya yarı sentetik sarı msak kullanı yorum. Birincil yan etki, güçlü bir vücut kokusu ve olası hafif mide rahatsız lı ğ ı dı r.

Peki sarı msak yağ ı ndan nasıl faydalanabilirsiniz?

Hassas kişiler için "Allimed" adı verilen basit bir sarı msak kullanarak yavaş yavaş başlamak en iyisidir. Bartonella uzmanı Dr. L. Robert Mozayani bu ürünü önermektedir. Kabul ediyorum. Yüksek dozda bu iyi giderse sarı msak yağ ı na geçin. Henüz esansiyel yağ veya yarı sentetik sarı msak kullanmak istemezsiniz. Sade sarı msak yağ ı kullanı n.

Göz önünde bulundurulması gereken markalar Puritans Pride veya Nature's Way'dir.

JAMES SCHALLER, MD, MAR ve KIMBERLY MOUNTJOY, MS

Ancak birçok sarı msak takviyesinin "kokusuz" olduğu unu lütfen unutmayı n. Bu ürünlerden kaçın n çünkü güçlü kokusu, işe yarayan bir marka kullandığı nı zı n işaretidir.

Bu dikkatli ve nazik bir yaklaşı mdı r. Normal sarı msak veya Allimed ile başlayı n. Daha sonra yumuşak bir yağ a geç in. Ve sonra New York'taki Zhang kliniğ inden "allisin" adı verilen yarı sentetik, güçlü bir sarı msak ilacı nı düşünün.

İ laçlara duyarlı lı ğ ı nı z varsa, mast hücre aktivasyon sendromuna (MCAS), PANDAS veya PANS'a sahipseniz bu en iyi yaklaşı mdı r.

Sonunda amaç, Zhang Kliniğ inden yarı sentetik sarı msak almanızı sağ lamaktır. 2006 yılı nda QingCai Zhang'ı n Lyme, Babesia ve Bartonella'yı tedavi etmek için Çin tı bbı hakkı ndaki kitabı nı okudum . Daha sonra Florida'da onunla birlikte kullandığı kapsamlı saflık testini öğrenmek için saatler harcadım, ama aynı zamanda özel yarı sentetik sarı msağı nı n gücünde vurguladı ; sanırım onlarca yıl önce Çin'de intravenöz olarak verildiğ inde oğ lunun hayatı nı kurtardığı na inanıyorum.

Allisin ürününü New York'taki Zhang Clinic'ten sipariş etmeniz yeterli. Ama lütfen bunu anlayın, Q.

Zhang'ı n ürünün adı "allisin"dir ve bu sadece sı radan bir sarı msak değildir. Etkisini göstermek için, küçük bir kapsülün size 36 saat boyunca derin bir sarı msak kokusu vereceğ ini unutmayı n. Y. Zhang, sarı msak esansiyel yağ ı nı n Babesia'ya karşı derin etkisi olduğu unu buldu . 33

LYME, BABESIA VE BARTONELLA'YI ÖLDÜRMEK İÇİN BİTKİLER VE ESAS YAĞLAR

Son olarak, Johns Hopkins'ten Y. Zhang, Lyme, Babesia ve Bartonella'nın tedavisi için rutin olarak inciler yayınlıyor. 2020 yılında Y. Zhang ve ekibi, Babesia'dan canı'ye karşı yüksek aktiviteye sahip esansiyel yağları tespit etti.

³³ 97 esansiyel yağları taradılar ve belirlediler

Babesia'yı ortadan kaldırmak için en iyi tedavi olarak sarımsak yağı.

Siyah ceviz

(Juglans nigra)

Siyah cevizin *Borrelia burgdorferi*'yi azalttığı da gösterilmiştir. Johns Hopkins'teki Zhang ekibi tarafı ndan test tüplerinde.

Feng , bir laboratuvar çalışması nda siyah cevizin yalnızca %1'lik ekstraktını n, anti biyotik doksisisiklin ve sefuroksim ile karşı laştı rı ldı ğ ı nda *B. burgdorferi*'ye (Lyme hastalığı) bakterisinin yaygı n bir türü karşı daha iyi aktiviteye sahip oldu ğ unu buldu

Başlangı çta, bu bitki hakkı nda antibiyotik yetenekleriyle ilgili pek fazla şey bulamadı m - pek çok önde gelen naturopat ders kitabı nda, bitkisel ders kitapları nda ve PubMed'in 34 milyon makalesinde. Ancak Feng'in *Borrelia*'ya karşı güç lütüklerinden bahseden raporuna ek olarak , Naturopathic Herbalist'te Siyah cevizden de bahsediliyor; bu kitapta natüropat Dr. Marisa Marciano bakterilere, vücuda da ğ ı lmı ş bakterilere ve maya enfeksiyonları na karşı faydalar bildiriyor (ve hatta tedavi ediyor) parazitik kurtçuklar).34 Müshil olabilir, bu nedenle yüksek doz, gevşek dı şkı ya neden olabilir.

Siyah cevizin aktif bileşenlerinden biri olan naftokinon juglon antifungal, toksin, antimikrobiyal,

JAMES SCHALLER, MD, MAR ve KIMBERLY MOUNTJOY, MS

ve antiparaziterdir. Önerilen tentür 1:4, %25, günde üç kez 5-10 damla, haftada maksimum 15 mL dozdur. İki hafta çalışıp iki hafta ara vermeyi öneriyor. Woodland Essence, meyve suyu veya suya günde 3 kez 10-30 damla veya 1/8 - 1/4 çay kaşığı dozlamayı önerir.³⁵

Ho, Siyah ceviz ekstraktının sitokin adı verilen inflamatuvar kimyasalları azaltabildiğini bildirdi; belirli sitokinlerin düzeylerini düşürmek kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayabilir.³⁶ Çeşitli aralarında farklılıklar olması na rağmen siyah ceviz, inflamatuvar kimyasalları veya sitokinleri azaltmıştır. Şu sonuca varıyor: "Bu çalışmanın sonuçları ilk kez Siyah cevizin ölçülen altı sitokini (TNF- α , IL-1 β , IL-6, IL-8, IL-10 ve MCP) [düşürecek] bileşiklere sahip olduğunu gösterdi. 1)." ³⁶ Bu araştırmada, derin bağışıklık tepkimesine neden olan çok yaygın bir bakteriyel kimyasalın (LPS) uyardığı insan hücreleri kullanıldı. Bu nedenle etkili bir siyah ceviz dozu bulaşıcı ajanların agresif bir şekilde öldürülmesine neden olabilir, ancak Ho'nun araştırması nda kullanılan kültür bitkileri sitokin "gazo hattını" düşürdüğü için iltihaplanma bu bitkide daha az olabilir. Spesifik olarak, siyah ceviz, ekstrakt için hangi bitkinin alt tipinin kullanıldığını na bağlı olarak bir sitokinden bu inflamatuvar kimyasallardan altı ya kadar azaltmıştır.

Alchornea cordifolia

Alchornea cordifolia özleri, Zhang'a göre Babesia duncani'ye karşı iyi bir inhibitör etki gösterdi.³

Antimikrobiyal ve antiinflamatuvar aktiviteye sahiptir.^{37, 38, 39, 40} Alchornea cordifolia, birçok Afrika ülkesinde geleneksel şifalı bitkiler tarafından sıtmanı n⁴¹ [Babesia'ya benzeyen] tedavisinde kullanılmı ştı r .

Çalı ş malar önemli antimalaryal etkiler olduğunu göstermektedir.^{42, 43, 44}

Alchornea cordifolia ekstraktı nı n aktif bileşenleri , ellagic asit ve quercetin dahil olmak üzere karmaşı ktı r.⁴¹

Ellagik asidin sıtma'ya karşı savaştı ğ ı daha önce laboratuvar da gösterilmiştir.^{45,46}. Ama aynı zamanda Babesia'yı öldürmek için düşünöecek yeni bir bitkisel ürün de olabilir .

Ellagik asit (EA) çeşitli bitki ürünlerinde bulunur ve toksisitesi olmaksız ı n laboratuvar da ve vücutta antioksidan, antibakteriyel ve etkili antimalaryal aktiviteye sahiptir.⁴⁷ Ellagik asit Babesia'yı öldürebilir . Bu bitkisel özündenemek istiyorsanı z Source Naturals'tan tam meyveli Ellagik Asit içeren Nar Ekstresi 500 mg'a bakı n .

Kullanılan Uçucu Yağ lar

Lyme, Babesia ve Bartonella'ya karşı

Ticari olarak temin edilebilen 250 esansiyel yağ arası nda yaklaşık k bir düzine tanesi yüksek antimikrobiyal aktiviteye sahiptir.50 Ma, Bartonella enfeksiyonları na yönelik mevcut tedavinin, antibiyotik direnci ve kalıcı ılı ğ ı nedeniyle çok etkili olmadı ğ ı nı savunmaktadı r.48 Bartonella'ya karşı 32 esansiyel yağ ı denemiştir . En etkili Bartonella ölümü kekik, tarç ı n kabu ğ u, da ğ kokusu (kı ş), tarç ı n yapra ğ ı , sardunya, karanfil tomurcu ğ u, yenibahar, geranium burbon, ylang-ylang, citronella, elemi ve gü ve otu esansiyel yağ ı yla gerç ekleş ti. Sı rası yla kekik yağ ı ve tarç ı n kabu ğ u yağ ı nı n aktif maddeleri olan karvakrol ve sinnamaldehit, Bartonella'yı uzaklaşt ı rmayı baş ardı .

tamamen düşük dozlarda bile.

Feng ayrı ca esansiyel yağ larla ilgili bazı düş üncelerini de aktarı yor.49 Borrelia burgdorferi'ye (Lyme) karşı 34 esansiyel yağ ı inceledi . İ lk olarak Wińska'dan alı ntı yapı yor:

JAMES SCHALLER, MD, MAR ve KIMBERLY MOUNTJOY, MS

tüm esansiyel yağ ları n Lyme bakterilerine karşı aktiviteye sahip olmadı ğ ı nı buldu. Ancak düşük dozlarda bile Lyme'ı n ortadan kaldı rı lması zor kalı cı hücrelerini öldüren beş esansiyel yağ (kekik, tarç ı n kabuğ u, karanfil tomurcuğ u, citronella ve kı ş yeşili) buldular. İ lginç bir şekilde, oldukça aktif bazı esansiyel yağ ları n mükemmel anti-biyofilm yeteneğ ine sahip olduğ u bulundu; biyofilm benzeri yapı ları çözdüler. Benzer pozisyonları 2014 yı lı nda ücretsiz ders kitabı m Combating Biofilms'de yayı nlandı m. 2014 yı lı nda seç ilmiş uçucu yağ ları n (özellikle kekik, tarç ı n ve karanfil tomurcuğ u) Lyme biyofilmlerini yok ettiğ ini bildirmiştim. Esansiyel yağ ları n kombinasyonları en iyi sonucu verir ve yüksek doza gidildiğ inde midenin korunması gerekir. Yatı ştı rı cı Koruyucu Bitkiler, bataklı k ebegümeci kökü kapsüllerde aloe vera ve kaygan karaağ açtı r (Doğ anı n Yolu uygun maliyetli ve kullanı şlı dı r). Birinin diğ erinden daha iyi olduğ unu görmedim. Bir hafta boyunca bir mide bitkisini kullanmayı ve ardı ndan diğ erine geçmeyi düşünün.

Şaşı rtı cı bir şekilde, kekik, tarç ı n kabuğ u ve karanfil tomurcuğ u yağ ları , herhangi bir yeniden büyüme olmaksız ı n tüm canlı Lyme bakterilerini tamamen yok etti. Citronella ve win tergreen o kadar etkili değ ildi. Kekik yağ ı ndaki karvakrol Lyme'a karşı mükemmel aktiviteye sahipti.

2020 yı lı nda Y. Zhang ve araştı rma ekibi, Babesia dun 33 canı'ye karşı yüksek aktiviteye sahip esansiyel yağ ları tespit ettiLaboratuarda 97 esansiyel yağ ı taradı lar ve

LYME, BABESIA VE BARTONELLA'YI ÖLDÜRMEK İÇİN BİTKİLER VE ESAS YAĞLAR

Babesia'ya karşı etkili olan on tanesini belirledik ve en etkili iki bileşiğin (sarı msak yağı ve karabiber yağı) arayışını daha da daralttılar. Ayrıca Babesia için önerilen rutin tedavinin tekrarlamalara yol açabileceğini de buldular. Spesifik olarak, yüksek dozda atovakuon sıvısı (Mepron) ve azitromisin (Zithromax) Babesia'ya izin verebilir.

geri vermek. Buna karşılık, sarı msak yağı ve azitromisin kombinasyonu, düşük dozda Babesia'nın yok edildiğini gösterdi.

Göç 47 katı ve sıvı yağı araştırdı ve bunları hareketli Borrelia'ya (Lyme spiroketleri) ve ayrıca Lyme hastalığının tedavisinde kullanılan yaygın antibiyotiklere karşı hayatta kalan yuvarlak şekilli kalıcı hücrelere karşı test etti.⁵¹ Bu bakteriler güçlü bir koruyucu balçık veya biyofilm tabakasıyla korunur. Yalnızca öjenol ve sinnamaldehit içeren defne yaprağı yağı ve Cassia yağı, Lyme hastalığının farklı aşamalarını ve koruyucu biyofilmini yok etti. 2014 ders kitabı m Biyofilmlerle Mücadele'de de benzer bir rapor hazırlanmıştı m. 52

Yararlı bir çalıřma, üç esansiyel yağ içeren uçucu yağları araştırdı: kekik yağı, tarçın yağı ve karanfil yağı. Üçü de Borrelia'yı öldürdüğü gösterilen bir antibiyotik olan daptomisin'den bile daha güçlüdür. Sorucular. Bu Lyme hücreleri genellikle canlıdır ve tam antibiyotik tedavisinden sonra "devamlıdır". Ve sonra hastalar yavaş yavaş Lyme hastalığını geri geldiğini hissediyorlar.

JAMES SCHALLER, MD, MAR ve KIMBERLY MOUNTJOY, MS

Esansiyel yağ ları n kullanı mı nda pratik bir konu, hangi markanı n kullanı lacağ ı ve yiyeceklerle birlikte alı nan günlük dozun ne kadar olacağ ı dı r. Yirmi beş yı llı k kullanı mdan sonra çok düşük bir dozun pek iş e yarayacağ ı ndan şüpheliyim. Örneğ in, çoğ u akşam uygulanan klovanolün enfeksiyonlu diş etlerine uygulanması yla iyi sonuç lar gördüm. Ancak diş etlerine uygulanan bu dozun kan dolaşı mı nı za karı şarak eklemelerinizde, bağ ı rsakları nı zda veya beyninizde Borrelia, Babesia ve Bartonella gibi patojenleri öldürdüğ üne inanmı yorum .

Cinnamol, 1998'den beri kullandı ğ ı m bir bileşiktir ç ünküenfeksiyonlarda rutin olarak görülen koruyucu biyofilmleri yener; biyofilmler yaygı n olarak kullanı lan antibiyotiklerin başarı sı z olması na neden olur.⁵³ Bir biyofilm, bakterilerin öldürülmesini ortadan kaldı rı lması nı yirmi kat daha zorlaştı rabilir. Ayrı ca bu madde Candida türlerini ve onun biyo filmini baskı lamaktadı r. Uzun zaman önce temelleri öğ renirken bu bilgilerin hiç biri net değ ildi.

Ama belki de en iyi esansiyel yağ ları n nası l alı ndı ğ ı nı tam olarak merak ediyorsunuzdur? Buğ uyu burun boşluğ una yaymak için bir nebülizöre mi konuluyorlar? Hayı r. Çok sayı da yüksek kaliteli esansiyel yağ şirketi var.

Ancak kendi fonumla yaptı ğ ı m araştı rmaları n tamamı North American Herb and Spice tarafı ndan üretilen ürünlerle yapı ldı .

Tipik olarak hastaları ma üç ürün satı n alı yorum: kekik jeli topları , klovanol sı vı sı ve tarçı nol sı vı sı . Genellikle hastaları ma günde üç kez iki adet kekik jeli topunu yavaşı a öğ ünlere eklemelerini ve tolere edilirse artı rmaları nı sağ ları m.

Mide koruyucu bitki tozu içeren kapsüllerin içine klovanol ve tarçının sıvıları konur. Hastaları m ucuza Nature's Way Marshmallow Root, Aloe Vera kapsülleri veya Slippery Elm satın alı yor. Bu üç koruyucu mide bitkisinden birini al n ve kapsülü aç n. Örneğ in, Marshmallow Root kapsülünü al n, ay r n ve tozun yar s nı at n. Daha sonra esansiyel yağı aç k kapsül alanına b r rak n. Kapsülü kapat n. Umudumuz midenin iyi olması d r. Reaktif, hassas kişilerde, mast hücre sendromu olanlarda, PANDAS'ta veya PANS'ta genellikle günde üç kez bir damla ile başlı yorum. Eğ er bu başlangı ç yağı dozu midenizi rahatsız etmiyorsa iki günde bir damla arttı rı yorum. Yeterli miktarda mide koruyucu şifalı bitkilerle çoğ u hasta, her zaman günde üç öğ ünle birlikte al n an on damlaya ulaşabilir. Yukarı da bahsettiğ im en sevdiğ im üç esansiyel yağı dönüşümlü olarak kullanı yorum, böylece hepsi üç günde tükeniyor.

Çin takkesi (Scutellaria baicalensis veya Calvaria)

Doğ al tı p doktoru arkadaşları mı n desteklediğ i prensiplerden biri de şıfalı bitkileri birleştirmenin faydası dı r. Çin takkesinde diğ er bitkilerin emilimini artı ran bir bitkimiz var. Bu inanı lı maz bir özellik.

Aynı zamanda iyi bir antiviraldir. Keneler, Epstein-Barr, Parvo, Mycoplasma pneumoniae, HHV6 (bir herpes virüsü), Coxsackie ve COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2 gibi bir dizi virüs taşı r.

Alerjileri, otoimmüniteyi sakinleştirmeye iyi gelir ve sinirleri korur. Lyme hastalı ğ ı ndan beri Babesia, ve Bartonella her üç soruna da neden olabilir, bu güzel bir seç enektir.

Ancak bu bitki aynı zamanda aktif sarmal bakteriler, yuvarlak kardeş formlar ve koruyucu bir balç ık arkası na saklanan biyofilm korumalı bakteriler gibi Lyme hastalı ğ ı nı n üç formunun da en büyük öldürücüsüdür.⁵⁴

Cistus incanus (veya Cistus creticus)

Bazı insanlar Cistus creticus ve Cistus incanus'un aynı bitki olduğunu inanıyor. Klinik çalışmalar, Cistus creticus'un uçucu yağ ekstraktı'nın laboratuvar ortamında antibiyotik ve antibakteriyel etkilere sahip olduğunu göstermektedir.2 Ek laboratuvar çalışmaları, Cistus creticus'un birçok bakteriye karşı geniş ve etkili antimikrobiyal etkilere sahip olduğunu göstermiştir. Cistus creticus ayrıca Strep biyofilmini de yendi.

Cistus incanus bitki özleri yüzyıllardır geleneksel tıpta yan etki veya alerjik reaksiyon bildirilmeksizin kullanılmıştır. 160 hasta üzerinde yapılan randomize, yerboya kontrollü bir çalışmada, günde 220 mg Cistus incanus, plasebo grubuna göre daha az yan etkiyle iyi tolere edildi.

teasel

Dipsacus sylvestris yabani teasel veya dolgun teasel olarak bilinir. Ekstraktları Liebold tarafı ndan laboratuvarı da Lyme hastalı ğ ı na karşı incelenmiştir. 55, 59 Teasel, *Borrelia spiroketlerinin* tüm gelişimini engelledi .

Yabani teasel Lyme tedavisi olarak incelenmiştir.⁵⁶ Daha önce tüm *Borrelia* karşı tı araştı rmalar Lyme'a karşı etkili olmayan kök üzerine odaklanmı ştı . Ancak yapraklar yararlı antimikrobiyal etkiler göstermektedir.⁶¹

“Herx”in düşürülmesi Bitkilerle Reaksiyonlar

Güçlüve etkili şifalı bitkiler ve esansiyel yağ lardan kaynaklanan enfeksiyondan kaynaklanan döküntülerin neden olduğu rahatsızlığı azaltmak için beslenmeyi, saunaları , lenf masajı nı , hiperbarik tedaviyi, bağ layıcı ları ve düzinelerce başka seçeneği tanı tan birçok makale vardır. Sadece bitkisel Herx seçeneklerini ele alacağ ım.

ABD'nin önde gelen Çin Tı bbı uzmanı Dr. QingCai Zhang ile geçmişte yapı lan görüşmelerde, Puerarin-M bitkisinin, enfeksiyonları n etkili tedavisinden kaynaklanan patojenlerin ölmesinden kaynaklanan inflamatuvar kalı ntı ları n verdiği rahatsızlığı azaltabileceğ ine inanı yordu.

Bir Puerarin'i üç gün boyunca günde iki kez, ardı ndan günde üç kez deneyeceğ im. Her zaman işe yaradı yor ama denemeye değ er.

Şu adresten satın alı n:

Zhang Kliniğ i
(914) 259-0346

JAMES SCHALLER, MD, MAR ve KIMBERLY MOUNTJOY, MS

Çevrimiçi kullanı labilirlik

DrRons.com

Zhou, Puerarin'in yararlı etkilerinin kan damarları nı genişletmesi, kalbi koruması , iltihabı azaltması , beyni koruması , serbest radikalleri sakinleştirmesi ve ağ rı yı azaltması nedeniyle olduğ unu bildirdi.⁵⁷ Bu nedenle, bunun Herx ağ rı sı nı azaltma potansiyeli var. Beş hafta boyunca deneyin.

Klorella

Yıllar önce, özellikle ağır metaller olmak üzere toksin bağlayıcı olarak toz haline getirilmiş Chlorella'nın büyüleyici bir formunu araştırmak için işe alındım. Chlorella, birçok vitamin, mineral ve proteinle dolu bir yeşil alg türüdür. Ayrıca Hirooka tarafından östrojene benzeyerek vücuda zarar vermeye çalışılan kimyasalların bir bağlayıcısı olarak da önerilmiştir ("xeno" yabancı anlamına gelirken ksenoöstrojen olarak adlandırılır).⁵⁸ Bu yabancı östrojenler kanseri teşvik edebilir. Bazıları klorellanın çok çeşitli inflamatuvar kimyasalları bağlayabildiğine inanıyor, ancak bu başka bir kitabın konusu. Araştırmamda Bioray.com'dan NDF Organic adlı bir ürünün metalleri günler değil saatler içinde çıkardığını buldum. Yemek yemeden veya içmeden önce uyandırdığını zanda tam bir damlalık deneyin. Sadece yemeğinizdeki toksinlerin giderilmesini istemezsiniz. Kansere neden olan bazı ağır metalleri ve kimyasal kseno-östrojenleri kaybedebilirsiniz.⁵⁸ Ayrıca, iltihaplı kimyasalları ve ölen döküntülerdeki toksinleri bağ

Karahindiba kökü

Karahindiba kökünün, karaciğerin rahatsızlığına neden olan inflamatuvar kimyasalları giderilmesine yardımcı olma rolünü desteklediğine inanılmaktadır. Gonzalez-Castejon, karahindiba kökünün birçok bitki kimyasalının vücudun birçok bölgesinde antioksidan ve antiinflamatuvar aktiviteye sahip olduğunu gösteren kanıtların bulunduğunu bildirdi.⁵⁹

Modifiye Narenciye Pektini

Yiyeceklerden veya şifalı bitkilerden en az 90 dakika uzakta, günde 3, iki kez başlamaya çalışın. Pectasol markası nı kullanmayı düşünün.

Modifiye edilmiş narenciye pektini, ağrı r metalleri ve muhtemelen enfeksiyondan kaynaklanan döküntüleri azaltır veya uzaklaştırır. Meme, prostat ve melanom kanseri tedavisinde önemli bir takviye olarak kullanımı na ilişkin geniş yayı nlar bulunmaktadır. Kanser nüksetmesini ve tümörün ilerlemesini teşvik edebilen Galektin-3'ü inhibe eder. (Kaynak: DrEliaz.com)

Optifiber Yalı n

J. Callahan'dan alıntı yapan Nathan, Optifiber Lean'in çok güçlü bir bağlayıcı olabileceğini öne sürüyor.60 Hiç bir fikrim yok. Kolestiramin gibi bazı bağlayıcıları n, yağlı kimyasalları bağlayarak yağ da çözünen vitaminleri azaltıp azaltmadığını merak ediyorum. Hala bu konu üzerinde çalışıyorum ancak bunun rutin bir sorun olduğundan şüpheliyim.

Japon Knotweed'i

Japon knotweed'in enfekte vücut üzerinde sakinleştirici bir etkisi vardır. Japon knotweed, enfeksiyonlardan kaynaklanan aşırı inflamasyonun bir kısmını engeller. "Sitokinler" adı verilen bazı inflamatuvar kimyasalları. Örneğin, bir fare çalışması'nda MMP-1 ve MMP-3'ü düşüren tek bitki knotweed'dir.7 Knotweed, MMP-9'u etkileyen, IL-6 ve TNF- α 'yı düşüren ve muhtemelen COX-2'yi değıştiren oldukça aktif bir bitkidir. Knotweed'den elde edilen resveratrolün farelerde güneş hasarı'na karşı koruyucu bir etkisi var ve bazıları bunun insan hücrelerinde de oluşabileceğini düşünüyor.

Esrar Türevleri

Esrardan elde edilen CBD, CBG ve THC, esrarı n Herx reaksiyonları nı nası l etkilediğ ine bir göz atmayı gerektirir.⁶¹ Tümör nekroz faktörüalfa (TNF-a), interlökin (IL)-1 β , IL-6 ve interferon gamma en sı k incelenen proteazlardı r. inflamatuvar kimyasallar ve bunları n seviyeleri, CBD, CBG veya CBD+THC kombinasyonu ile tedaviden sonra tutarlı bir şekilde azaldı , ancak yalnız ca THC ile bu azalma olmadı . CBD, CBG veya CBD'nin THC ile kombinasyon halinde uygulandı ğ ı 22 çalı şmada en az bir inflamatuvar kimyasal azaltı ldı . Ve 24 çalı şmada hastalı k veya sakatlı klarda bazı iyileşmeler görüldü THC tek başı na proinflamatuvar sitokin düzeylerini azaltmadı ... ancak bir çalı şmada nöropatik ağ rı da iyileşmelerle sonuç

CBD, CBG ve CBD+THC kombinasyonu vücutlarda (yalnı zca laboratuvarlarda değ il) ağ ı rlı klı olarak antiinflamatuvar etki gösterir.⁶¹

Kuersetin

Quercetin, interlökin-1 beta (IL-1 β), tümör nekroz faktörü alfa (TNF- α), interlökin-6 (IL-6) ve interlökin gibi sitokinleri düşüren anti-inflamatuar bitki pigmentinin bir örneğidir. -8 (IL 8).62 Bunlar en iyi şekilde Radiance Labs 14 sitokin inflamasyon paneli ve/veya Ulusal Yahudi Sağ lı ğ ı laboratuvarı gelişmiş inflamasyon kimyasalları TH1/TH2 Panel A tarafı ndan değ erlendirilir. Doktorlar bu panelden dolayı ikincisine yalnızca onları arayarak erişebilirler. kendi sitelerinde mevcut değ il. Numunenizin buz üzerinde gönderilmesi gerekmektedir ve panelin maliyeti yaklaşık k 280,00\$'dır.

Gelişmiş sitokinlerin, interlökinlerin ve interferonları n seviyelerini ölçmek için diğ er rutin ulusal laboratuvarları kullanmak tamamen zaman kaybı dır.

SON NOTLAR

1. Gadila S, Köz ME. Farklı Kültür Koşulları nda Yetiştirilen Bartonella'nın Antibiyotik Duyarlı lı ę ı .
Patojenler. 2021 8 Haziran;10(6):718. doi: 10.3390/patojenler10060718. PMID: 34201011 PMCID: PMC8229624.
2. Feng J, Leone J, Schweig S ve Zhang Y. B. burgdorferi'nin Büyüyen ve Büyümeyen Formları na Karşı Etki Aç ı sı ndan Doğ al ve Botanik İ laç ları n Deę erlendirilmesi .
Ön. Med., 21 Şubat 2020 Bk. Bulaş ı cı Hastalı klar – Gözetim, Önleme ve Tedavi <https://doi.org/10.3389/fmed.2020.00006>
3. Zhang Y, Alvarez-Manzo H, Leone J, Schweig S ve Zhang Y. (2021) Botanik İ laç lar Cryptolepis sanguinolenta, Artemisia annua, Scutellaria baicalensis, Polygonumcuspidatum ve Alchornea cordifolia Babesia duncani'ye Karşı Engelleyici Aktivite Gösterin .
Ön. Hücre. Bulaşt ı rmak. Mikrobiyol. 11:624745. doi: 10.3389/fcimb.2021.624745

JAMES SCHALLER, MD, MAR ve KIMBERLY MOUNTJOY, MS

4.Ma, Xiao; Leone, Jacob; Schweig, Sunjya; Zhang, Ying. Sabit Faz Bartonella henselae'ye Karşı Etkinliği Olan Botanik İ laçlar. Bulaşıcı Mikroplar ve Hastalıklar 3(3):s 158-167, Eylül 2021. doi: 10.1097/IM9.0000000000000069

5. Cryptolepis (Cryptolepis sanguinolenta) — Bitkisel Monograf (thesunlightexperiment.com), Erişim tarihi: 3 Kasım 2022.

6. Ajayi AF, Akhigbe RE. Erkek sıçanlarda Cryptolepis sanguinolenta yaprağı etanolik ekstraktı nın antifertilite aktivitesi . J Hum Reprod Sci. 2012 Oca;5(1):43-7.

7. Cui B, Wang Y, Jin J, Yang Z, Guo R, Li X, Yang L, Li Z. Resveratrol, Anti-İnflamatuar, Antioksidan ve Antiapoptotik Özellikler aracı Olarak Anti-MMP Ekspresyonuyla UVB'nin Neden Olduğu Fotoyaşlanmayı Tedavi Ediyor ve VEGF-B İfade Edimini Düzenleyerek Fotoyaşlanmayı Tedavi Eder. Oksit Med Hücreleri Longev. 4 Ocak 2022;2022:6037303. doi: 10.1155/2022/6037303. PMID: 35028009; PMCID: PMC8752231.

8. Buhner, S. Lyme Hastalığı Koenfeksiyonlarını İyileştirilmesi: Bartonella için Tamamlayıcı ve Bütünsel Tedaviler ve Mikoplazma. 5 Mayıs 2013, Healing Arts Press, Rochester VT.

9. Zhang H, Li C, Kwok ST, Zhang QW, Chan SW. Kurutulmuş Bitkinin Farmakolojik Etkilerine İlişkin Bir İnceleme

Polygonum cuspidatum'un (Hu Zhang) Köküve Bileşenleri.
Kanıtta Dayalı Tamamlayıcı Alternatif Med.
2013;2013:208349. doi: 10.1155/2013/208349.
Epub 2013 30 Eylül. PMID: 24194779; PMCID: PMC3806114.
(Hidavi)

10. Buhner, S. Bitkisel Antibiyotikler, 2. Baskı : İlaça
Dirençli Bakterilerin Tedavisinde Doğal Alternatifler. 17
Temmuz 2012 Storey Publishing, North Adams MA. s. 61,
70, 72.

11. Buhner, S. Lyme Koenfeksiyonları için Doğal
Tedaviler: Anaplazma, Babesia ve Ehrlichia. 22 Şubat 2015.
Şifa Sanatları Basını, Rochester VT. s. 219—224.

12. Zhang H, Li S, Si Y, Xu H. Andrographolide ve türevleri:
Güncel başarılar ve gelecek perspektifleri. Eur J Med
Kimya. 15 Kasım 2021;224:113710. doi: 10.1016/
j.ejmech.2021.113710.
Epub 2021 20 Temmuz. PMID: 34315039.

13. Okhwarobo A, Faludun JE, Erharuyi O, Imieje V, Falodun
A, Langer P. Andrographis panikulata'nın hastalıklar ve
ötesi için tıbbi özelliklerinden yararlanmak : fitokimyası
ve farmakolojisinin gözden geçirilmesi. Asya Pac J Trop
Dis. 2014 Haziran; 4(3): 213–222. doi: 10.1016/
S2222-1808(14)60509-0

14. Buhner, S ve Nathan N. Lyme'i İyileştirmek: Lyme
Borreliosis ve Koenfeksiyonları'nın Doğal İyileşmesi

JAMES SCHALLER, MD, MAR ve KIMBERLY MOUNTJOY, MS

Chlamydia ve Benekli Ateş Rickettsiosis, 2. Baskı . 7
Aralık 2015. Raven Press. s. 204, 215.

15. Rawls, B. Hücresel Sağ lık Çözümü Bitkilerin Bilim
Destekli Gücüyle Tam Sağ lık Potansiyelinizden
Yararlanı n. 18 Haziran 2022, First Do No Harm
Publishing, Raleigh NC.

16. Tang T, Targan SR, Li ZS, Xu C, Byers VS, Sandborn
WJ. Randomize klinik ç alı ş ma: bitkisel ekstrakt
Aktif üseratif kolitte HMPL-004 - çift
Sürekli salı mlı mesalazinin kör karşı laştı rması .
Aliment Pharmacol Ther. 2011 Ocak;33(2):194-202.
doi: 10.1111/j.1365-2036.2010.04515.x. Epub 2010
30 Kası m. PMID: 21114791.

17. Sandborn WJ, Targan SR, Byers VS, Rutty DA, Mu
H, Zhang X, Tang T. Andrographis panikulata
Aktif üseratif kolit için ekstrakt (HMPL-004). Ben J
Gastroenterol. 2013 Ocak;108(1):90-8. doi: 10.1038/
ajg.2012.340. Epub 2012 9 Ekim. PMID: 23044768;
PMCID: PMC3538174.

18. Suriyo T, Pholphana N, Ungtrakul T, Rangkadilok
N, Panomvana D, Thiantanawat A, Pongpun W,
Satayavivad J. Standartlaştı rı lımı ş Bir Çoklu Oral
Doz Uygulaması nı n Ardı ndan Klinik Parametreler
Sağ lı klı Taylandlı Deneklerde Andrographis
panikulata Kapsülü Planta Med. 2017 Haz;83(9):778-789.

doi: 10.1055/s-0043-104382. Epub 2017 1 Mart.
PMID: 28249303.

19. Pang J, Dong W, Li Y, Xia X, Liu Z, Hao H, Jiang L, Liu Y. Houttuynia cordata Thunb'un saflaştırılması . Güvenliği ve Antiviral Etkinliği Artırmak İçin Büyük Gözenekli Reçine ve Ardından Mikroemülsiyon Kapsüleme Kullanan Esansiyel Yağ . Moleküler. 2017 Şubat 15;22(2):293. doi: 10.3390/molecules22020293. PMID: 28212296; PMCID: PMC6155675.

20. Laldinsangi C. Houttuynia cordata'nın terapötik potansiyeli : Güncel bir inceleme. Heliyon. 2022 Ağ u 24;8(8):e10386. doi: 10.1016/j.heliyon.2022. e10386. PMID: 36061012; PMCID: PMC9433674.

21. Zhang Q, Zhao JJ, Xu J, Feng F, Qu W. Uncaria cinsinin tıbbi kullanımları , fitokimyası ve farmakolojisi . J Etnofarmakol. 2015 Eylül 15;173:48-80. doi: 10.1016/j.jep.2015.06.011. Epub 2015 17 Haziran. PMID: 26091967.

22. Buhner, S. Bitkisel Antibiyotikler, 2. Baskı : İlaça Dirençli Bakterilerin Tedavisinde Doğal Alternatifler. 17 Temmuz 2012 Storey Publishing, North Adams MA. P. 379.

23. Goc A, Rath M. Fitokimyasalların ve mikro besinlerin borrelia önleyici etkinliği : bir güncelleme. Adv Infect Dis. 2016 Haz;3(3-4):75-82. doi: 10.1177/

JAMES SCHALLER, MD, MAR ve KIMBERLY MOUNTJOY, MS

2049936116655502. Epub 2016 4 Temmuz. PMID: 27536352; PMCID: PMC4971593.

24. Schaller, J. Artemisinin, Artesunate, Artemisinin Asit ve Sı tma, Babesia ve Kanserde Kullanı lan Artemisia'nı n Diğ er Türevleri. 13 Ekim 2006, Hope Academic Press, Tampa FL.

25. Elfawal MA, Gray O, Dickson-Burke C, Weathers PJ, Rich SM. Artemisia annua ve artemisininler insan Babesia microti ve altı Candida sp.'ye karşı etkisizdir . Longhua Chin Med. 2021 Haz;4:12. doi: 10.21037/lcm-21-2. PMID: 34316676; PMCID: PMC8312716.

26. Juteau F, Masotti V, Bessière JM, Dherbomez M, Viano J. Artemisia annua esansiyel yağ ı nı n antibakteriyel ve antioksidan aktiviteleri. Fitoterapia. 2002 Ekim;73(6):532-5. doi: 10.1016/s0367-326x(02)00175-2. PMID: 12385883.

27. Bilia AR, Santomauro F, Sacco C, Bergonzi MC, Donato R. Artemisia annua L. Esansiyel Yağ ı : Çok Sayı da Antimikrobiyal Özelliğ e Sahip Olağ anüstüBir Bileşen. Kanı ta Dayalı Tamamlayı cı Alternatif Med. 2014;2014:159819. doi: 10.1155/2014/159819. Epub 2014 1 Nisan. PMID: 24799936; PMCID: PMC3995097.

28 Jansen FH. Dihidroartemisinin farmasötik ölüm yolculuğu. Malar J. 2010 Temmuz 22;9:212. doi: 10.1186/1475-2875-9-212. PMID: 20649950; PMCID: PMC2916014.

29. <https://www.rxlist.com/artesunate-drug.htm>. Erişim tarihi: 3 Kasım 2022.

30. https://www.cdc.gov/malaria/diagnosis_treatment/discontinuation_artesunate.html.

31. https://www.cdc.gov/malaria/new_info/2020/artesunate_onay.htm. 3 Kasım 2022'de erişildi.

32. Price RN, Douglas NM. Sıtma için Artemisinin kombinasyon tedavisi: iyi etkinliğin ötesinde. Clin Infect Dis. 2009 Aralık 1;49(11):1638-40. doi: 10.1086/647947. PMID: 19877970; PMCID: PMC4627500.

33. Zhang Y, Bai C, Shi W, Alvarez-Manzo H, Zhang Y. Babesia duncani'ye karşı Yüksek Aktiviteye Sahip Sarımsak Yağı ve Karabiber Yağı İçeren Esansiyel Yağların Tanımlanması. Patojenler. 2020 Haziran 12;9(6):466. doi: 10.3390/patojenler9060466. PMID: 32545549; PMCID: PMC7350376.

34. <https://thenaturopathicherbalist.com/herbs/il/juglans-nigra-black-walnut/> Marisa Marciano. Erişim tarihi: 3 Kasım 2022.

JAMES SCHALLER, MD, MAR ve KIMBERLY MOUNTJOY, MS

35. <https://woodlandessence.com/products/black-ceviz-liquid-extract>. Erişim tarihi: 3 Kasım 2022.

36. Ho KV, Schreiber KL, Vu DC, Rottinghaus SM, Jackson DE, Brown CR, Lei Z, Sumner LW, Coggeshall MV, Lin CH. Siyah Ceviz (*Juglans nigra*) Ekstraktları , Lipopolisakkaritle Uyarı lan İnsan Promonositik Hücre Hattı U-937'den Proinflamatuvar Sitokin Üretimini Engeller. Ön Farmakol. 19 Eylül 2019; 10:1059. doi: 10.3389/fphar.2019.01059. PMID: 31607915; PMCID: PMC6761373.

37. Ebi, GC (2001). *Alchornea cordifolia*'nın antimikrobiyal aktiviteleri . *Fitoterapia* 72, 69–72. doi: 10.1016/S0367-326X(00)00254-9

38. Manga, HM, Brkic, D., Marie, DE ve Quetin Leclercq, J. (2004). *Alchornea cordifolia*'nın (Schumacher Thonn.) Mull'un in vivo antiinflamatuvar aktivitesi . *Arg. (Sütleğ engiller)*. *J. Etnofarmakol.* 92, 209–214. doi: 10.1016/j.jep.2004.02.019

39. Shan, B., Cai, YZ, Brooks, JD ve Corke, H. (2008). *Polygonum cuspidatum*'un antibakteriyel özellikleri kökler ve bunları n başlı ca biyoaktif bileşenleri. *Gıda Kimyası* 109, 530–537. doi: 10.1016/j.foodchem.2007.12.064

40. Ghanim, H., Sia, CL, Abuaysheh, S., Korzeniewski, K., Patnaik, P., Marumganti, A., ve diğ erleri. (2010). Bir

resveratrol içeren bir *Polygonum cuspidatum* ekstraktı nı n antiinflamatuvar ve reaktif oksijen türlerini baskı layı cı etkileri . J. Clin. Endokrinol. Metab. 95, E1–E8. doi: 10.1210/düzeltilme.24.7.9998

41. Boniface, PK, Ferreira, SB ve Kaiser, CR (2016). *Alchornea cordifolia*'nı n (Schumach. & Thonn.) Muell'in fitokimyası , etnobotaniğ i ve farmakolojik önemindeki son eğ ilimler . Arg. J. Etnofarmakol. 191, 216–244. doi: 10.1016/j.jep.2016.06.021

42. Mustofa, A., Benoit-Vical, F., Pelissier, Y., Kone Bamba, D. ve Mallie, M. (2000). Batı Afrika geleneksel tı bbı nda kullanı lan bitki ekstraktları nı n antiplazmodiyal aktivitesi. J. Etnofarmakol. 73, 145–151. doi: 10.1016/S0378-8741(00) 00296-8

43. Mesia, GK, Tona, GL, Nanga, TH, Cimanga, RK, Apers, S., Cos, P., ve diğ erleri. (2008). Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden 45 bitki ekstraktı nı n antiprotozoal ve sitotoksik taraması . J. Etnofarmakol. 115, 409–415. doi: 10.1016/j.jep.2007.10.028

44. Ayisi, NK, Appiah-Opong, R., Gyan, B., Bugyei, K. ve Ekuban, F. (2011). *Plasmodium falciparum*: Klorokin, *Alchornea cordifolia*, *Ficus polita* ve Diğ er İ laçları n Etki Seç iciliğ inin Tetrazolyum Bazlı Kolorimetrik Test ile Değ erlendirilmesi. Malar. Res. Treat 2011, 816250. doi: 10.4061/2011/816250

JAMES SCHALLER, MD, MAR ve KIMBERLY MOUNTJOY, MS

45. Lamikanra, A., Ogundaini, AO ve Ogungbamila, FO (1990). *Alchornea Cordifolia* Yaprakları nı n Antibakteriyel Bileşenleri . *Fitother. Res.* 4, 198–200. doi: 10.1002/ptr.2650040508

46. Banzouzi, JT, Prado, R., Menan, H., Valentin, A., Roumestan, C., Mallie, M., ve diğ erleri. (2002). *Alchornea cordifolia* ekstraktları nı n in vitro antiplazmodiyal aktivitesi ve aktif bir bileşenin tanı mlanması : ellagik asit. *J. Etnofarmakol.* 81, 399–401. doi: 10.1016/S0378-8741(02)00121-6

47. Beshbishy AM, Batiha GE, Yokoyama N, Igarashi I. Ellagik asit mikroküreleri, Babesia ve Theileria'nı n in vitro ve Babesia microti'nin büyümesini kısı tlar. in vivo. *Parazit Vektörleri.* 2019 Mayıs 28;12(1):269. doi: 10.1186/s13071-019-3520-x. PMID: 31138282; PMCID: PMC6537213.

48. Ma X, Shi W, Zhang Y. Sabit Faz *Bartonella henselae*'ye Karşı Yüksek Aktiviteye Sahip Esansiyel Yağ lar . *Antibiyotikler (Basel).* 2019 Kası m 30;8(4):246. doi: 10.3390/antibiyotikler8040246. PMID: 31801196; PMCID: PMC6963529.

49. Feng J, Zhang S, Shi W, Zubcevik N, Miklossy J, Zhang Y. Baharat veya Yemeklik Otlardan Elde Edilen Seçici Esansiyel Yağ lar, Sabit Faz ve Biyofilm *Borrelia burgdorferi*'ye Karşı Yüksek Aktiviteye Sahiptir. Ön Orta

(Lozan). 2017 Ekim 11;4:169. doi: 10.3389/fmed.2017.00169. PMID: 29075628; PMCID: PMC5641543.

50. Wińska K, Maćzka W, Łyczko J, Grabarczyk M, Czubaszek A, Szumny A. Antimikrobiyal Ajanlar Olarak Esansiyel Yağlar-Efsane mi, Gerçek Alternatif mi? Moleküler. 2019 Haziran 5;24(11):2130. doi: 10.3390/moleküler24112130. PMID: 31195752; PMCID: PMC6612361.

51. Goc A, Niedzwiecki A, Rath M. Seçilen organik yağların ve yağ asitlerinin anti-borreliae etkinliği. BMC Tamamlayıcı Alternatif Med. 2019 4 Şubat;19(1):40. doi: 10.1186/s12906-019-2450-7. PMID: 30717726; PMCID: PMC6360722.

52. Schaller J, Mountjoy K. Biyofilmlerle Mücadele. 11 Nisan 2014. Uluslararası Bulaşıcı Hastalıklar Basını. Napoli FL.

53. Didehdar M, Chegini Z, Tabaeian SP, Razavi S, Shariati A. Cinnamomum: Bakteriyel ve Mantar Biyofilmiyle İlişkili Enfeksiyonun İnhibisyonu için Yeni Terapötik Ajanlar. Ön Hücre Mikrobiyoloji Etkiler. 2022 8 Temmuz;12:930624. doi: 10.3389/fcimb.2022.930624. PMID: 35899044; PMCID: PMC9309250.

JAMES SCHALLER, MD, MAR ve KIMBERLY MOUNTJOY, MS

54. Goc A, Niedzwiecki A, Rath M. Fitokimyasalları n ve mikro besinlerin *Borrelia burgdorferi*'ye karşı antibakteriyel aktivitesinin in vitro değ erlendirilmesi ve *Borrelia garinii*. J Appl Microbiol. 2015 Aralı k; 119(6):1561-72. doi: 10.1111/jam.12970. PMID: 26457476; PMCID: PMC4738477.

55. Liebold T, Straubinger RK, Rauwald HW. *Dipsacus sylvestris* Huds'tan lipofilik ekstraktları n büyümeyi inhibe edici aktivitesi. *Borrelia burgdorferi* ss'ye karşı in vitro kökler. Pharmazie. 2011 Ağ u;66(8):628-30. PMID: 21901989.

56. Saar-Reismaa P, Bragina O, Kuhtinskaja M, Reile I, Laanet PR, Kulp M, Vaher M. *Dipsacus fullonum* L. Yaprakları ndan Biyoaktiflerin Ekstraksiyonu ve Fraksiyonasyonu ve Anti *Borrelia* Aktivitelerinin Değ erlendirilmesi . İ laç (Basel). 2022 12 Ocak;15(1):87. doi: 10.3390/ph15010087. PMID: 35056144; PMCID: PMC8779505.

57. Zhou YX, Zhang H, Peng C. Puerarin: farmakolojik etkilerin gözden geçirilmesi. Fitother Res. 2014 Temmuz;28(7):961-75. doi: 10.1002/ptr.5083. Epub 2013 13 Aralı k. PMID: 24339367.

58. Hirooka T, Nagase H, Uchida K, Hiroshige Y, Ehara Y, Nishikawa J, Nishihara T, Miyamoto K, Hirata Z. Bisfenol A'nı n biyolojik parçalanması ve

yeşil alg *Chlorella fusca* var. tarafından östrojenik aktivitesinin ortadan kalkması. boşluk. Çevre Toksikol Kimyası. 2005 Ağustos;24(8):1896-901. doi: 10.1897/04-259r.1. PMID: 16152959.

59. González-Castejón M, Visioli F, Rodríguez Casado A. Karahindibanın çeşitli biyolojik aktiviteleri. Nutr Rev. 2012 Eylül;70(9):534-47. doi: 10.1111/j.1753-4887.2012.00509.x. Epub 2012 17 Ağustos. PMID: 22946853.

60. Nathan N. Toxic: Vücudunuzu Kif Toksisitesi, Lyme Hastalığı, Çoklu Kimyasal Hassasiyetler ve Kronik Çevre Hastalıkları'ndan İyileştirin. Zafer Kemer Yayıncılık, Las Vegas NV. 9 Ekim 2018, s. 73.

61. Henshaw FR, Dewsbury LS, Lim CK, Steiner GZ. Kannabinoidlerin Pro ve Anti İnflamatuar Sitokinler Üzerindeki Etkileri: İn Vivo Çalışmaları'nın Sistemik Bir İncelemesi. Esrar Cannabinoid Res. 2021 Haz;6(3):177-195. doi: 10.1089/can.2020.0105. Epub 2021 28 Nisan. PMID: 33998900; PMCID: PMC8266561.

62. Al-Khayri JM, Sahana GR, Nagella P, Joseph BV, Alessa FM, Al-Mssallem MQ. Potansiyel Anti-İnflamatuar Moleküller Olarak Flavonoidler: Bir İnceleme. Moleküller. 2022 Mayıs 2;27(9):2901. doi: 10.3390/moleküller27092901. PMID: 35566252; PMCID: PMC9100260.

Kaynakça

2018 ACVIM Forum Araştırma Özet Programı .
Seattle, Washington, 14 - 15 Haziran 2018. J Vet Intern
Med. 2018 Kasım;32(6):2144-2309. doi: 10.1111/
jvim.15319. Epub 2018 25 Ekim. PMID: 32744743; PMCID:
PMC6272043.

Ajayi AF, Akhigbe RE. Erkek sıçanlarda *Cryptolepis*
sanguinolenta yaprağı etanolik ekstraktının
antifertilite aktivitesi . J Hum Reprod Sci. 2012 Oca;5(1):43-7.

Alexander W. Bütünleştirici Sağlık Sempozyumu: Kanser
ve Kronik Lyme Hastalığı . P T. 2009 Nisan; 34(4): 202–
214. PMCID: PMC2697090.

Al-Khayri JM, Sahana GR, Nagella P, Joseph BV, Alessa FM,
Al-Mssallem MQ. Potansiyel Anti İnflamatuar Moleküller
Olarak Flavonoidler: Bir İnceleme. Moleküller. 2022
Mayıs 2;27(9):2901. doi: 10.3390/molecules27092901.
PMID: 35566252; PMCID: PMC9100260.

Álvarez-Martínez FJ, Barrajo n-Catalán E, Micol V. Doğal
Kökenli Bileşiklerle Antibiyotik Direnciyle Mücadele:
Kapsamlı Bir İnceleme.

JAMES SCHALLER, MD, MAR ve KIMBERLY MOUNTJOY, MS

Biyotıplar. 2020 Eki 11;8(10):405. doi: 10.3390/biyotıp8100405. PMID: 33050619; PMCID: PMC7601869.

Aucott JN, Rebman AW, Crowder LA, Kortte KB. Tedavi sonrası Lyme hastalığı sendromu semptomatolojisi ve yaşam işleyişi üzerindeki etkisi: Burada bir şey var mı? Kaliteli Yaşam Arş. 2013;22:75–84.

Ayisi, NK, Appiah-Opong, R., Gyan, B., Bugyei, K. ve Ekuban, F. (2011). Plasmodium falciparum: Klorokin, Alchornea cordifolia, Ficus polita ve Diğer İlaçların Etki Seçiciliğinin Tetrazolyum Bazlı Kolorimetrik Test ile Değerlendirilmesi. Malar. Res. Treat 2011, 816250. doi: 10.4061/2011/816250

Banzouzi, JT, Prado, R., Menan, H., Valentin, A., Roumestan, C., Mallie, M., ve diğerleri. (2002). Alchornea cordifolia ekstraktlarının in vitro antiplazmodiyal aktivitesi ve aktif bir bileşenin tanımlanması: ellagik asit. J. Etnofarmakol. 81, 399–401. doi: 10.1016/S0378-8741(02)00121-6

Barthold SW, Hodzic E, Imai DM, Feng S, Yang X, Luft BJ. Tigesiklinin kalıcı Borrelia burgdorferi'ye karşı etkisizliği. Antimikrob Ajanlar Kemoterapi. 2010;54:643–51.

Basavegowda N, Patra JK, Baek KH. Alternatif Olarak Uçucu Yağlar ve Mono/bi/tri-Metalik Nanokompozitler

LYME, BABESIA VE BARTONELLA'YI ÖLDÜRMEK İÇİN BİTKİLER VE ESAS YAĞLAR

Çoklu İlaçla Dirençli Patojenik Mikroorganizmalarla Mücadelede Antimikrobiyal Ajan Kaynakları : Genel Bir Bakış. Moleküler. 2020 Şubat 27;25(5):1058. doi: 10.3390/moleküler25051058. PMID: 32120930; PMCID: PMC7179174.

Bergsson G, Arnfinnsson J, Steingrímsson Ó Thormar H. Gram pozitif kokları n yağ asitleri ve monogliseritlerle öldürülmesi. APMIS. 2001;109:670-8.

Beshbishy AM, Batiha GE, Yokoyama N, Igarashi I. Ellagik asit mikroküreleri, Babesia ve Theileria'nın in vitro ve Babesia microti'nin büyümesini kısıtlar.

in vivo. Parazit Vektörleri. 2019 Mayıs 28;12(1):269. doi: 10.1186/s13071-019-3520-x. PMID: 31138282; PMCID: PMC6537213.

Bilia AR, Santomauro F, Sacco C, Bergonzi MC, Donato R. Artemisia annua L. Esansiyel Yağları :

Çok Sayıda Antimikrobiyal Özelliğe Sahip Olanüstü Bir Bileşen. Kanıda Dayalı Tamamlayıcı Alternatif Med.

2014;2014:159819. doi: 10.1155/

2014/159819. Epub 2014 1 Nisan. PMID: 24799936; PMCID: PMC3995097.

Boniface, PK, Ferreira, SB ve Kaiser, CR

(2016). Alchornea cordifolia'nın (Schumacher & Thonn.)

Muell'in fitokimyası, etnobotanik ve farmakolojik önemindeki son eğilimler. Arg. J.

JAMES SCHALLER, MD, MAR ve KIMBERLY MOUNTJOY, MS

Etnofarmakol. 191, 216–244. doi: 10.1016/j.jep. 2016.06.021

Borugă O, Jianu C, Mișcă C, Goleț I, Gruia AT, Horhat FG. Thymus vulgaris esansiyel yağ ı : kimyasal bileşim ve antimikrobiyal aktivite. J Med Yaşam. 2014;7:56–60.

Brorson O, Brorson SH. Greyfurt çekirdeğ i ekstresi, Borrelia burgdorferi sensu lato'nun hareketli ve kistik formları na karşı güç lübir in vitro ajandı r . Enfeksiyon. 2007;35:206–8.

Brorson O, Brorson SH. Borrelia burgdorferi'nin omurilik sı vı sı nda in vitro kistik formlara dönüş ümü ve BSK-H ortamı nda inkübasyonla hareketli spiroketlere dönüş ümü Enfeksiyon. 1998;26:144–50.

Buhner, S ve Nathan N. Lyme Ş ifası : Lyme Borreliosis'in Doğ al İ yleş mesi ve Koenfeksiyonlar Chlamydia ve Benekli Ateş Rickettsiosis, 2. Baskı . Kuzgun Bası nı . 7 Aralı k 2015.

Buhner, S. Lyme Hastalı ğ ı Koenfeksiyonları nı n İ yleştirilmesi: Bartonella için Tamamlayı cı ve Bütünsel Tedaviler ve Mikoplazma. Ş ifa Sanatları Bası nı , Rochester VT. 5 Mayıs 2013.

LYME, BABESIA VE BARTONELLA'YI ÖLDÜRMEK İÇİN BİTKİLER VE ESAS YAĞLAR

Buhner, S. Bitkisel Antibiyotikler, 2. Baskı : İlaça Dirençli Bakterilerin Tedavisinde Doğal Alternatifler.

Katlı Yayınları, North Adams MA. 17 Temmuz 2012.

Buhner, S. Lyme Koenfeksiyonları için Doğal Tedaviler: Anaplazma, Babesia ve Ehrlichia. Şifa Sanatları Basını, Rochester VT. 22 Şubat 2015.

Burt S. Uçucu yağlar: antibakteriyel özellikleri ve gıdalardaki potansiyel uygulamaları -bir inceleme. Int J Gıda Mikrobiyolojisi. 2004;94:223-53.

Cameron DJ, Johnson L, Maloney EL. Lyme hastalığına kanı t deęerlendirmeleri ve kılavuz önerileri: bilinen kene ısırıkları nın, eritema migrans döküntülerinin ve kalıcı hastalığın klinik yönetimi. Uzman Rev Anti-Infect Ther. 2014;12:1103-35.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri. 2014 Lyme hastalığı web sitesi. Şu adreste bulunabilir: <http://www.cdc.gov/lyme/>. Erişim tarihi: 13 Eylül 2014.

Chaieb K, Hajlaoui H, Zmantar T, Kahla-Nakbi AB, Rouabhia M, Mahdouani K, Bakhrouf A. Karanfil esansiyel yağının kimyasal bileşimi ve biyolojik aktivitesi, *Eugenia caryophyllata* (*Syzigium aromaticum* L. Myrtaceae): kısa bir inceleme. Fitother Res. 2007;21:501-6.

JAMES SCHALLER, MD, MAR ve KIMBERLY MOUNTJOY, MS

Chen BJ, Fu CS, Li GH, Wang XN, Lou HX, Ren DM, Shen T.
Potansiyel terapötik ajanlar olarak sinnamaldehit
analogları . Mini Rev Med Kimya. 2017;17:33–43.

Chouhan S, Sharma K, Guleria S. Bazı uçucu yağ ları n
antimikrobiyal aktivitesi - mevcut durum ve gelecek
perspektifleri. İ laç lar (Basel). 2017;4:E58.

Cortés-Rojas DF, de Souza CR, Oliveira WP. Karanfil
(*Syzygium aromaticum*): değ erli bir baharat. Asyalı Pac J
Trop Biomed. 2014;4:90–6.

Cowan MM. Antimikrobiyal ajan olarak bitki ürünleri.
Clin Microbiol Rev. 1999;12:564–82.

Cryptolepis (*Cryptolepis sanguinolenta*) - Bitkisel Monograf
(thesunlightexperiment.com).
Erişim tarihi: 3 Kası m 2022.

Cui B, Wang Y, Jin J, Yang Z, Guo R, Li X, Yang L, Li Z.
Resveratrol, Anti-İ nflamatuar, Antioksidan ve Antiapoptotik
Özellikler Aracı lı ğ ı yla Anti-MMP Ekspresyonuyla UVB'nin
Neden Olduğ u Fotoyaşlanmayı Tedavi Eder ve
Fotoyaşlanmayı Tedavi Eder VEGF-B İ fadesinin Yukarı Düzenlenme
Oksit Med Hüresi Longev. 4 Ocak 2022;2022:6037303. doi:
10.1155/2022/6037303. PMID: 35028009; PMCID:
PMC8752231.

LYME, BABESIA VE BARTONELLA'YI ÖLDÜRMEK İÇİN BİTKİLER VE ESAS YAĞLAR

Delong AK, Çiçekçi B, Maloney EL, Phillips SE.

Kalıcı semptomları olan hastalarda Lyme

hastalığının antibiyotiklerle yeniden tedavisi:

randomize, plasebo kontrollü klinik çalışmaları ve biyoistatistiksel

Contemp Clin Denemeleri. 2012;33:1132-42.

Desbois AP, Mearns-Spragg A, Smith VJ. Diatom

Phaeodactylum tricornutum'dan elde edilen bir yağ asidi,

çoklu dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) dahil olmak

üzere çeşitli bakterilere karşı antibakteriyeldir. Mar

Biyoteknoloji. 2009;11:45-52.

Desbois AP. Antimikrobiyal yağ asitlerinin tıpta, tarımda

ve diğer endüstrilerde potansiyel uygulamaları.

Son Pat Antiinfect İlaç Discov. 2012;7:111-22.

Devi KP, Sakthivel R, Nisha SA, Suganthi N, Pandian SK.

Eugenol, hücre zarının bütünlüğünü ündeğ iştirir ve

nozokomiyal patojen Proteus mirabilis'e karşı etki eder.

Arch Pharm Res. 2013;36:282-92.

Didehdar M, Chegini Z, Tabaeian SP, Razavi S, Shariati A.

Cinnamomum: Bakteriyel ve Mantar Biyofilmiyle İlişkili

Enfeksiyonun İnhibisyonu için Yeni Terapötik Ajanlar. Ön

Hücre Mikrobiyolojiyi Etkiler. 2022 Temmuz

8;12:930624. doi: 10.3389/fcimb.2022.930624. PMID:

35899044; PMCID: PMC9309250.

JAMES SCHALLER, MD, MAR ve KIMBERLY MOUNTJOY, MS

Dracon FA. Botaniklerin gı dalarında biyokoruyucu olarak kullanımı . Gıda Teknolojisi. 2004;58:20-8.

Ebi, GC (2001). *Alchornea cordifolia*'nın antimikrobiyal aktiviteleri . *Fitoterapia* 72, 69-72. doi: 10.1016/S0367-326X(00)00254-9

Elfawal MA, Gray O, Dickson-Burke C, Weathers PJ, Rich SM. *Artemisia annua* ve artemisininler insan *Babesia microti* ve altı *Candida sp.*'ye karşı etkisizdir . *Longhua Chin Med*. 2021 Haz;4:12. doi: 10.21037/lcm-21-2. PMID: 34316676; PMCID: PMC8312716.

Embers ME, Barthold SW, Borda JT, Bowers L, Doyle L, Hodzic E, Jacobs MB, Hasenkampf NR, Martin DS, Narasimhan S, Phillippi-Falkenstein KM, Purcell JE, Ratterree MS, Philipp MT. Yaygın enfeksiyonun antibiyotik tedavisini takiben *Borrelia burgdorferi*'nin alı yanaklı makaklarda kalıcı ılı ğ ı . *PLoS Bir*. 2012;7:e29914.

Estrada-Peña A, Cevitanes A, Sprong H, Millán J. Kene ve Kene Kaynaklı Patojen Araştı rmaları ndaki Tuzaklar, Bazı Öneriler ve Veri Paylaşımı Çağ ır ısı . *Patojenler*. 2021 7 Haziran;10(6):712. doi: 10.3390/patojenler10060712. PMID: 34200175; PMCID: PMC8229135.

Fallon BA, Keilp JG, Corbera KM, Petkova E, Britton CB, Dwyer E, Slavov I, Cheng J, Dobkin J, Nelson DR, Sackeim HA. Lyme ensefalopatisi için tekrarlanan IV antibiyotik tedavisinin randomize, plasebo kontrollü bir çalışması . Nöroloji. 2008;70:992–1003.

Fang F, Xie Z, Quan J, Wei X, Wang L, Yang L. Baicalin, NF- κ B/MAPK sinyal yolunu aşağı doğru düzenleyerek ve NLRP3 inflammatuarı nı n aktivasyonunu inhibe ederek *Propionibacterium* aknelerinin neden olduğu cilt iltihabı nı baskı lar. *Braz J Med Biol Arş.* 2020 Ekim 21;53(12):e9949. doi: 10.1590/1414-431X20209949. PMID: 33111746; PMCID: PMC7584154.

Feldlaufer MF, Knox DA, Lusby WR, Shimanuki H. Yağ asitlerinin Amerikan yavru çürüklüğ ü hastalığı nı n etken maddesi olan *Bacillus* larvaları na karşı antimikrobiyal aktivitesi. *Apidologie.* 1993;24:95–9.

Feng J, Auwaerter PG, Zhang Y. *Borrelia burgdorferi*'ye karşı ilaç kombinasyonları in vitro kalı cı lı ğ a sahiptir: daptomisin, sefoperazon ve doksisisiklin kullanı larak elde edilen yok etme. *PLoS Bir.* 2015;10:e0117207.

Feng J, Leone J, Schweig S, Zhang Y. *B. burgdorferi*'nin Büyüyen ve Büyümeyen Formları na Karşı Aktivite Açısı ndan Doğ al ve Botanik İ laçları n Değ erlendirilmesi . *Ön Med (Lozan).* 2020 Şubat 21;7:6.

JAMES SCHALLER, MD, MAR ve KIMBERLY MOUNTJOY, MS

doi: 10.3389/fmed.2020.00006. PMID: 32154254; PMCID: PMC7050641.

Feng J, Shi W, Miklossy J, Tauxe GM, McMeniman CJ, Zhang Y. Sabit Faz *Borrelia burgdorferi*'ye Karşı Güçlü Aktiviteye Sahip Esansiyel Yağ ları n Belirlenmesi . Antibiyotikler (Basel). 2018 Ekim 16;7(4):89. doi: 10.3390/antibiyotikler7040089. PMID: 30332754; PMCID: PMC6316231.

Feng J, Wang T, Zhang S, Shi W, Zhang Y. *Borrelia burgdorferi* için hızlı canlı lı k değ erlendirmesi ve antibiyotik duyarlı lı k testi için optimize edilmiş bir SYBR yeşil I/PI tahlili . PLoS Bir. 2014;9:e111809.

Feng J, Zhang S, Shi W, Zhang Y. Seftriakson darbe dozlaması , darbe dozlaması olmadan Daptomisin/ doksisisiklin/sefuroksim ile sterilize edilen biyofilm benzeri mikrokoloni B. *Burgdorferi* Persists'ı yok etmekte başarı sı z oluyor. Ön Mikrobiyol. 2016;7:1744-52.

Feng J, Zhang S, Shi W, Zubcevik N, Miklossy J, Zhang Y. Baharat veya Yemeklik Otlardan Elde Edilen Seçici Uçucu Yağ lar, Sabit Faz ve Biyofilm *Borrelia burgdorferi*'ye Karşı Yüksek Aktiviteye Sahiptir. Ön Med (Lozan). 2017 Ekim 11;4:169. doi: 10.3389/fmed.2017.00169. PMID: 29075628; PMCID: PMC5641543.

LYME, BABESIA VE BARTONELLA'YI ÖLDÜRMEK İÇİN BİTKİLER VE ESAS YAĞLAR

Feng J, Leone J, Schweig S ve Zhang Y. B. burgdorferi'nin Büyüyen ve Büyümeyen Formları na Karşı Aktivite Açısından Doğal ve Botanik İlaçların Değerlendirilmesi . Ön. Med., 21 Şubat 2020 Bk. Bulaşıcı Hastalıklar – Gözetim, Önleme ve Tedavi <https://doi.org/10.3389/fmed.2020.00006>

Freese E, Shew CW, Galliers E. Lipofilik asitlerin antimikrobiyal güdada katkı maddeleri olarak işlevi. Doğ a. 1979;241:321-5.

Friedman M, Buick R, Elliott CT. Antibiyotik e dirençli Bacillus cereus bitkisel hücreleri ve sporları , Escherichia coli ve Staphylococcus aureus'a karşı doğal olarak oluşan bileşiklerin antibakteriyel aktiviteleri . J Gıda Koruması 2004;67:1774-8.

Gadila S, Köz ME. Farklı Kültür Koşulları nda Yetiştirilen Bartonella'nın Antibiyotik Duyarlı lığı . Patojenler. 2021 8 Haziran;10(6):718. doi: 10.3390/patojenler10060718. PMID: 34201011 PMCID: PMC8229624.

Ghanim, H., Sia, CL, Abuaysheh, S., Korzeniewski, K., Patnaik, P., Marumganti, A., ve diğerleri. (2010). Polygonum cuspidatum ekstraktı nın antiinflamatuvar ve reaktif oksijen türlerini baskı layıcı etkileri resveratrol içerir. J. Clin. Endokrinol. Metab. 95, E1-E8. doi: 10.1210/dzeltme.24.7.9998

JAMES SCHALLER, MD, MAR ve KIMBERLY MOUNTJOY, MS

Goc A, Niedzwiecki A, Rath M. Seçilen organik yağ ları n ve yağ asitlerinin anti-borreliae etkinliđ i. BMC Tamamlayı cı Alternatif Med. 2019 4 Şubat;19(1):40. doi: 10.1186/s12906-019-2450-7. PMID: 30717726; PMCID: PMC6360722.

Goc A, Niedzwiecki A, Rath M. Borrelia'nı n Aktif ve Kalı cı Formları na Karşı Doksisisiklinin Fitokimyasallar ve Mikro Besinlerle İ şbirliđ i sp. Uluslararası J Biol Sci. 2016 Temmuz 22;12(9):1093-103. doi: 10.7150/ijbs.16060. PMID: 27570483; PMCID: PMC4997053.

Goc A, Niedzwiecki A, Rath M. Fitokimyasalları n ve mikro besinlerin Borrelia burgdorferi ve Borrelia garinii'ye karşı antibakteriyel aktivitesinin in vitro deđ erlendirilmesi. J Appl Microbiol. 2015 Aralı k;119(6):1561-72. doi: 10.1111/jam.12970. PMID: 26457476; PMCID: PMC4738477.

Goc A, Rath M. Fitokimyasalları n ve mikro besinlerin borrelia önleyici etkinliđ i: bir güncelleme. Adv Infect Dis. 2016 Haz;3(3-4):75-82. doi: 10.1177/2049936116655502. Epub 2016 4 Temmuz. PMID: 27536352; PMCID: PMC4971593.

González-Castejón M, Visioli F, Rodriguez-Casado A. Karahindibanı n çeşitli biyolojik aktiviteleri. Nutr Rev. 2012 Eylü;70(9):534-47. doi: 10.1111/j.1753-4887.2012.00509.x. Epub 2012 17 Ağ ustos. PMID: 22946853.

LYME, BABESIA VE BARTONELLA'YI ÖLDÜRMEK İÇİN BİTKİLER VE ESAS YAĞLAR

Greenway DLA, Dyke KGH. Linoleik asidin *Staphylococcus aureus*'un büyümesi üzerindeki önleyici etkisinin mekanizması. J Gen Mikrobiyol. 1979;115:233-45.

Heath RJ, White SW, Rock CO. Antibakteriyel maddeler için hedef olarak lipid biyosentezi. Prog Lipid Res. 2001;40:467-97.

Henshaw FR, Dewsbury LS, Lim CK, Steiner GZ. Kanabinoidlerin Pro ve Anti İnflamatuar Sitokinler Üzerindeki Etkileri: İn Vivo Çalışmaları n Sistematik Bir İncelemesi. Esrar Cannabinoid Res. 2021 Haziran; 6(3):177-195. doi: 10.1089/can.2020.0105. Epub 2021 28 Nisan. PMID: 33998900; PMCID: PMC8266561.

Hirooka T, Nagase H, Uchida K, Hiroshige Y, Ehara Y, Nishikawa J, Nishihara T, Miyamoto K, Hirata Z. Bisfenol A'nın biyolojik olarak parçalanması ve yeşil alg *Chlorella fusca* var. tarafı ndan östrojenik aktivitesinin ortadan kalkması. boşluk. Çevre Toksikol Kimyası. 2005 Ağ ustos;24(8):1896-901. doi: 10.1897/04-259r.1. PMID: 16152959.

Ho KV, Schreiber KL, Vu DC, Rottinghaus SM, Jackson DE, Brown CR, Lei Z, Sumner LW, Coggeshall MV, Lin CH. Siyah Ceviz (*Juglans nigra*) Ekstraktları, Lipopolisakkaritle Uyarı lan İnsan Promonositik Hücre Hattı U-937'den Proinflammatuar Sitokin Üretimini Engeller. Ön Farmakol. 19 Eylül 2019;

JAMES SCHALLER, MD, MAR ve KIMBERLY MOUNTJOY, MS

10:1059. doi: 10.3389/fphar.2019.01059. PMID: 31607915; PMCID: PMC6761373.

Horowitz RI, Freeman PR. Hassas Tı p: MSIDS Modelinin Kronik Lyme Hastalığı /Tedavi Sonrası Lyme Hastalığı Sendromu ve Diğer Kronik Hastalıkları n Tanı mlanması nda, Teşhis Edilmesinde ve Tedavisinde Rolü Bölüm 2. Sağ lı k Hizmeti (Basel). 2018 Kası m 5;6(4):129. doi: 10.3390/healthcare6040129. PMID: 30400667; PMCID: PMC6316761.

<https://thenaturopathicherbalist.com/herbs/il/juglans-nigra-siyah-ceviz/> Marisa Marciano. Kası m ayı nda erişildi 3, 2022.

<https://woodlandessence.com/products/siyah-ceviz-sı vı -ekstresi>. Erişim tarihi: 3 Kası m 2022.

https://www.cdc.gov/malaria/diagnosis_treatment/discontinuation_artesunate.html.

https://www.cdc.gov/malaria/new_info/2020/artesunate_onay.html. Erişim tarihi: 3 Kası m 2022.

<https://www.rxlist.com/artesunate-drug.htm>. Erişim tarihi: 3 Kası m 2022

Hubáek Z, Rudolf I. Zoonotik ve Sapronotik Mikrobiyal Ajanları n Sistematik Araştı rması . Mikrobiyal Zoonozlar ve Sapronozlar. 10 Kası m 2010: 129–297. Yayı nlanan

LYME, BABESIA VE BARTONELLA'YI ÖLDÜRMEK İÇİN BİTKİLER VE ESAS YAĞLAR

çevrimiçi 2010 10 Kasım. doi: 10.1007/978-90-481-9657-9_8. PMCID: PMC7119992.

Jansen FH. Dihidroartemisinin farmasötik ölüm yolculuğu. Malar J. 2010 Temmuz 22;9:212. doi: 10.1186/1475-2875-9-212. PMID: 20649950; PMCID: PMC2916014.

Jayaprakasha GK, Rao LJ. Cinnamomum zeylanicum'un kimyası, biyogenezi ve biyolojik aktiviteleri. Crit Rev Food Sci Nutr. 2011;51:547-62.

Jiang BG, Jia N, Jiang JF, Zheng YC, Chu YL, Jiang RR, Wang YW, Liu HB, Wei R, Zhang WH, Li Y, Xu XW, Ye JL, Yao NN, Liu XJ, Huo QB, Sun Y, Song JL, Liu W, Cao WC. Borrelia miyamotoi

İnsanlarda ve Kenelerde Enfeksiyonlar, Kuzeydoğu Çin. Acil Enfekte Dis. 2018 Şubat;24(2):236-241. doi: 10.3201/eid2402.160378. PMID: 29350133; PMCID: PMC5782893.

Juteau F, Masotti V, Bessière JM, Dherbomez M, Viano J. Artemisia annua esansiyel yağı'nın antibakteriyel ve antioksidan aktiviteleri. Fitoterapia. 2002 Ekim;73(6):532-5. doi: 10.1016/s0367-326x(02)00175-2. PMID: 12385883.

Kabara JJ, Swieczkowski DM, Conley AJ, Truant JP. Antimikrobiyal ajanlar olarak yağ asitleri ve türevleri. Antimikrob Ajanlar Kemoterapi. 1972;2:23-8.

JAMES SCHALLER, MD, MAR ve KIMBERLY MOUNTJOY, MS

Kabara JJ, Vrabie R. Antimikrobiyal lipidler: doğal ve sentetik yağ asitleri ve monogliseritler. Lipitler. 1977;12:753-9.

Karbach J, Ebenezer S, Warnke PH, Behrens E, Al-Nawas B. Klinik olarak ilgili oral patojenlere karşı yaygın antiseptik solüsyonlara alternatif olarak Avustralya antibakteriyel esansiyel yağ ları nı n antimikrobiyal etkisi. Klinik Laboratuvarı . 2015;61:616-8.

Kuchta K, Cameron S. Patogenez Geleneği : Şifalı Bitkilerin Geleneksel Kullanımı na Dayalı Hastalıkları nı Patogenezini Aydınlatmak İçin Yeni Bir Hipotez. Ön Farmakol. 25 Ekim 2021;12:705077. doi: 10.3389/fphar.2021.705077. PMID: 34759818; PMCID: PMC8572966.

Laldinsangi C. Houlttuynia cordata'nı n terapötik potansiyeli : Güncel bir inceleme. Heliyon. 2022 Ağ u 24;8(8):e10386. doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e10386. PMID: 36061012; PMCID: PMC9433674.

Lamikanra, A., Ogundaini, AO ve Ogungbamila, FO (1990). Alchornea Cordifolia Yaprakları nı n Antibakteriyel Bileşenleri . Fitother. Res. 4, 198-200. doi: 10.1002/ptr.2650040508

Lee CW, Kim SC, Kwak TW, Lee JR, Jo MJ, Ahn YT, Kim JM, An WG. Geleneksel Bir Bitki Olan Bangpungtongsung-San'ı n Anti-İ nflamatuar Etkileri

Reçete. Kanı ta Dayalı Tamamlayıcı Alternatif Med.
2012; 2012: 892943. 29 Temmuz 2012'de çevrimiçi
yayınlandı . doi: 10.1155/2012/892943. PMCID: PMC3414209.

Leyva Salas M, Mounier J, Valence F, Coton M, Thierry A,
Coton E. Gıda biyolojik koruma için antifungal mikrobiyal
ajanlar-bir inceleme. Mikroorganizmalar.
2017;5:E37.

Liebold T, Straubinger RK, Rauwald HW. *Dipsacus sylvestris*
Huds'tan lipofilik ekstraktları n büyümeyi inhibe edici
aktivitesi . *Borrelia burgdorferi* ss'ye karşı in vitro kökler .
Pharmazie. 2011 Ağ u;66(8):628-30.
PMID: 21901989.

Loewen PS, Marra CA, Marra F. Erken Lyme hastalığı nı n
tedavisinin sistematik incelemesi. İ laçlar. 1999;
57:157-73.

Lu M, Dai T, Murray CK, Wu MX. Kekik Yağı nı n Çoklu
İ laca Dirençli Klinik İ zolatlara Karşı Bakterisidal Özelliğ i.
Ön Mikrobiyol. 2018 Ekim 5;9:2329. doi: 10.3389/
fmicb.2018.02329. Hata düzeltmesi: Ön
Mikrobiyol. 12 Temmuz 2021;12:713573. PMID: 30344513;
PMCID: PMC6182053.

Ma X, Shi W, Zhang Y. Sabit Faz *Bartonella henselae*'ye Karşı
Yüksek Aktiviteye Sahip Esansiyel Yağ lar .
Antibiyotikler (Basel). 2019 Kası m 30;8(4):246. doi: 10.3390/

JAMES SCHALLER, MD, MAR ve KIMBERLY MOUNTJOY, MS

antibiyotikler8040246. PMID: 31801196; PMCID: PMC6963529.

Ma, Xiao; Leone, Jacob; Schweig, Sunjya; Zhang, Ying. Sabit Faz Bartonella henselae'ye Karşı Etkinliği Olan Botanik İlaçlar. Bulaşıcı Mikroplar ve Hastalıklar 3(3):s 158-167, Eylül 2021. doi: 10.1097/IM9.0000000000000069

Maitland J, Fleming SA. Organik Kimya. Birleşik Krallık: WW Norton & Co Inc (Np); 1998.

Manga, HM, Brkic, D., Marie, DE ve Quetin Leclercq, J. (2004). Alchornea cordifolia'nın (Schumacher Thonn.) Mull'un in vivo antiinflamatuar aktivitesi . Arg. (Süleğengiller). J. Etnofarmakol. 92, 209-214. doi: 10.1016/j.jep.2004.02.019

Martin KW, Ernst E. Bakteriyel enfeksiyonların tedavisi için bitkisel ilaçlar: kontrollü klinik çalışmaları gözden geçirilmesi. J Antimikrob Kemoterapisi. 2003;51:241-6.

Marzec NS, Nelson C, Waldron PR, Blackburn BG, Hosain S, Greenhow T, Green GM, Lomen Hoerth C, Golden M, Mead PS. Kronik Lyme Hastalığı Tanı ve Tedavisi Konulan Hastaların Tedavisi Sırasında Elde Edilen Ciddi Bakteriyel Enfeksiyonlar - Amerika Birleşik Devletleri. MMWR Morb Mortal Haftalık Rep. 2017 Haziran 16;66(23):607-609. doi: 10.15585/mmwr.mm6623a3. PMID: 28617768; PMCID: PMC5657841.

LYME, BABESIA VE BARTONELLA'YI ÖLDÜRMEK İÇİN BİTKİLER VE ESAS YAĞLAR

Mayaud L, Carricajo A, Zhiri A, Aubert G. 13 esansiyel yağ ın, antibiyotiklere karşı değışen hassasiyete sahip suşlara karşı bakteriyostatik ve bakterisidal aktivitesinin karşılaştırılması . Lett Appl Microbiol. 2008;47:

McHale D, Laurie WA, Woof MA. Batı Hindistan defneyağ larının bileşimi. Gıda Kimyası 1977;2:19–25.

Melo AD, Amaral AF, Schaefer G, Luciano FB, de Andrade C, Costa LB, Rostagno MH. Farklı bakteri türlerine karşı antimikrobiyal etki ve yem katkı maddesi olarak kullanılan uçucu yağ lara bakteri adaptasyonu. Can J Microbiol. 2015;61:263–71.

Mesia, GK, Tona, GL, Nanga, TH, Cimanga, RK, Apers, S., Cos, P., ve diğ erleri. (2008). Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden 45 bitki ekstraktının antiprotozal ve sitotoksik taraması . J. Etnofarmakol. 115, 409–415. doi: 10.1016/j.jep.2007.10.028

Morrison KC, Hergenrother PJ. Karmaşık ve çeşitli bileşiklerin sentezi için başlangıç noktası olarak doğ al ürünler. Nat Prod Temsilcisi 2014;31:6–14.

Murgia R, Cinco M. Borrelia burgdorferi'de farklı stres koşullarıyla kistik formlarının indüksiyonu . APMIS. 2004;112:57–62.

Mustofa, A., Benoit-Vical, F., Pelissier, Y., Kone Bamba, D. ve Mallie, M. (2000). Antiplazmodiyal

JAMES SCHALLER, MD, MAR ve KIMBERLY MOUNTJOY, MS

Batı Afrika geleneksel tıbbında kullanılan bitki ekstraktları'nın aktivitesi. J. Etnofarmakol. 73, 145–151. doi: 10.1016/S0378-8741(00) 00296-8

Nabavi SF, Di Lorenzo A, Izadi M, Sobarzo-Sánchez E, Daglia M, Nabavi SM. Tarçın'ın antibakteriyel etkileri: çiftlikten gıda, kozmetik ve ilaç endüstrilerine. Besinler. 2015;7:7729–48.

Nair A, Mallya R, Suvarna V, Khan TA, Momin M, Omri A. Nanopartiküller-Antimikrobiyal Esansiyel Yağların Çekici Taşıyıcıları. Antibiyotikler (Basel). 2022 14 Ocak;11(1):108. doi: 10.3390/antibiyotikler11010108. PMID: 35052985; PMCID: PMC8773333.

Nathan N. Toxic: Vücudunuzu Kif Toksisitesi, Lyme Hastalığı, Çoklu Kimyasal Hassasiyetler ve Kronik Çevre Hastalıklarından İyileştirin. Zafer Kemerli Yayıncılık, Las Vegas NV. 9 Ekim 2018.

Nazzaro F, Fratianni F, De Martino L, Coppola R, De Feo V. Esansiyel yağların patojenik bakteriler üzerindeki etkisi. İlaç (Basel). 2013;6:1451–74.

Oguntomole O, Nwaeze U, Eremeeva ME. Nijerya'da Halk Sağlığında Kene, Pire ve Bit Kaynaklı Hastalıklar ve Veterinerlik Önemi. Trop Med Infect Dis. 2018 3 Ocak;3(1):3. doi: 10.3390/tropicalmed3010003. PMID: 30274402; PMCID: PMC6136614.

Okhwarobo A, Faludun JE, Erharuyi O, Imieje V, Falodun A, Langer P. *Andrographis panikulata*'nın hastalıklar ve ötesi için tıbbi özelliklerinden faydalanmak : fitokimyası ve farmakolojisinin gözden geçirilmesi. *Asya Pac J Trop Dis*. 2014 Haziran; 4(3): 213-222. doi: 10.1016/S2222-1808(14)60509-0

Ooi LS, Li Y, Kam SL, Wang H, Wong EY, Ooi VE. Tarçının yağının antimikrobiyal aktiviteleri ve

Çin şifalı bitkisi *Cinnamomum cassia* Blume'dan elde edilen sinnamaldehit. *Ben J Chin Med*. 2006;34:511-22.

Pang J, Dong W, Li Y, Xia X, Liu Z, Hao H, Jiang L, Liu Y. *Houttuynia cordata* Thunb'un saflaştırılması . Güvenliği ve Antiviral Etkinliği Artırmak İçin Büyük Gözenekli Reçine ve Ardından Mikroemülsiyon Kapsüleme Kullanan Esansiyel Yağ . *Moleküler*. 2017 Şubat 15;22(2):293. doi: 10.3390/molecules22020293. PMID: 28212296; PMCID: PMC6155675.

Patterson SL, Jafri K, Narvid JA, Margaretten M. Ani İdrar Tutulmaları ve Duyusal Eksiklikleri Olan Genç Bir Kadının Artrit Bakımı Res (Hoboken). 2018 Nis;70(4):635-642. doi: 10.1002/acr.23473. Epub 2018 18 Şubat. PMID: 29125903; PMCID: PMC5876077.

JAMES SCHALLER, MD, MAR ve KIMBERLY MOUNTJOY, MS

Pisoschi AM, Pop A, Georgescu C, Turcuş V, Olah NK. Mathe E.Doğ al antimikrobiyallerin gı dadaki rolüne genel bakı ş. Eur J Med Kimya. 2018;143:922–35.

Pizzorno JF, Murray MT. Doğ al Tı p Ders Kitabı - 2 ciltlik set 5. Baskı . Churchill Livingstone. 13 Temmuz 2020.

Fiyat RN, Douglas NM. Sı tma için Artemisinin kombinasyon tedavisi: iyi etkinliđ in ötesinde. Clin Infect Dis. 2009 Aralı k 1;49(11):1638-40. doi: 10.1086/647947. PMID: 19877970; PMCID: PMC4627500.

Rawls, B. Hücresel Sağ lı k Çözümü Bilim Destekli ile Tam Sağ lı k Potansiyelinizden Yararlanı n
Bitkilerin Gücü 18 Haziran 2022, First Do No Harm Publishing, Raleigh NC.

Rudenko N, Golovchenko M, Kybicova K, Vancova M. Lyme hastalı ğ ı spiroketlerinin metamorfozları : Borrelia kalı cı ları nı n fenomeni. Parazit Vektörleri. 2019 Mayı s 16;12(1):237. doi: 10.1186/s13071-019-3495-7. PMID: 31097026; PMCID: PMC6521364.

Saar-Reismaa P, Bragina O, Kuhtinskaja M, Reile I, Laanet PR, Kulp M, Vaher M. Dipsacus fullonum L.'den Biyoaktiflerin Ekstraksiyonu ve Fraksiyonasyonu. Yapraklar ve Borrelia Karşı tı Faaliyetlerinin Değ erlendirilmesi. İ laç (Basel). 2022 12 Ocak;15(1):87.

LYME, BABESIA VE BARTONELLA'YI ÖLDÜRMEK İ Ç İ N B İ TKİ LER VE ESAS YAĞ LAR

doi: 10.3390/ph15010087. PMID: 35056144; PMCID: PMC8779505.

Sandborn WJ, Targan SR, Byers VS, Rutty DA, Mu H, Zhang X, Tang T. *Andrographis panikulata* Aktif üseratif kolit için ekstrakt (HMPL-004). Ben J Gastroenterol. 2013 Ocak;108(1):90-8. doi: 10.1038/ajg.2012.340. Epub 2012 9 Ekim. PMID: 23044768; PMCID: PMC3538174.

Sapi E, Balasubramanian K, Poruri A, Maghsoudlou JS, Socarras KM, Timmaraju AV, Filush KR, Gupta K, Shaikh S, Theophilus PA, Luecke DF, MacDonald A, Zelger B. *Borrelial* Lenfositomlarda *Borrelia* biyofilminin in vivo varlı ğ ı nı n kanı tı . Eur J Mikrobiol İ mmünol (Bp). 2016;6:9-24.

Sapi E, Bastian SL, Mpoy CM, Scott S, Rattelle A, Pabbati N, Poruri A, Burugu D, Theophilus PA, Pham TV, Datar A, Dhaliwal NK, MacDonald A, Rossi MJ, Sinha SK, Luecke DF. Biyofilm oluşumunun *Borrelia burgdorferi* tarafı ndan in vitro karakterizasyonu. PLoS Bir. 2012;7:e48277.

Sapi E, Kaur N, Anyanwu S, Luecke DF, Datar A, Patel S, Rossi M, Stricker RB. *Borrelia burgdorferi*'nin farklı morfolojik formları nı n in vitro antibiyotik duyarlı lı ğ ı nı n değ erlendirilmesi . Enfekte İ laç Direnci. 2011;4:97-113.

JAMES SCHALLER, MD, MAR ve KIMBERLY MOUNTJOY, MS

Schaller J. İnsan Babesia'sı na İ lişkin Laboratuvar Rehberi
Hematoloji Formları . Hope Academic Press, Tampa FL.
15 Eylül 2008.

Schaller, J. Artemisinin, Artesunate, Artemisininik Asit ve
Sı tma, Babesia ve Kanserde Kullanı lan Artemisia'nı n
Diğ er Türevleri . Hope Academic Press, Tampa FL. 13 Ekim
2006.

Schaller J. İnsan Babesiosisinin Tedavisi ve Tanı sı na
İ lişkin Sağ lı k Uzmanı Kı lavuzu: Yeni İnsan
Babesiosisinin Kapsamlı Bir İ ncelemesi
Türler ve İ leri Tedaviler. Hope Academic Press, Tampa FL.
16 Ekim 2006.

Schaller J. Bartonella, Babesia, Lyme Hastalı ğ ı ve
Diğ er Kene ve Pire Kaynaklı Enfeksiyonlar Hakkı nda
Bilmedikleriniz : Tedavi Hı zı nı n, İ yileşmenin ve Hasta
Memnuniyetinin Artı rı lması . Uluslararası Üniversite
Bulaş ıcı Hastalı klar Yayınları , Napoli FL. 8 Şubat 2012.

Schaller J, Mountjoy K. Bartonella, Babesia ve Lyme
Hastalı ğ ı için Kontrol Listeleri. Uluslararası Akademik
Enfeksiyon Araştı rma Bası nı , 27 Aralı k 2011.

Schaller J, Mountjoy K. Biyofilmlerle Mücadele.
Uluslararası Bulaş ıcı Hastalı k Bası nı . Napoli FL.
11 Nisan 2014.

Schauenstein E. Sudaki çoklu doymamış esterlerin otoksidasyonu: ürünlerin kimyasal yapısı ve biyolojik aktivitesi. J Lipid Res. 1967;8:417-28.

Scott JD, McGoey E, Pesapane RR. Kene Kaynaklı Patojenler Anaplasma phagocytophilum, Babesia odocoilei ve Borrelia burgdorferi Sensu Lato, Doğru Kanada'da Yaygın Kara Bacaklı Kenelerde. 27 Ekim 2022; 3(10): 1249-1256. doi: 10.37871/jbres1586, Makale Kimliği: JBRES1586, Mevcut adres: <https://www.jelsciences.com/articles/jbres1586.pdf>

Seidel V, Taylor PW. Pelagonium ekstraktları nı n ve bileşenlerinin hızla büyüyen mikobakterilere karşı in vitro aktivitesi. Int J Antimikrobiyal Ajanlar. 2004;23:613-9.

Shan, B., Cai, YZ, Brooks, JD ve Corke, H. (2008). Polygonum cuspidatum'un antibakteriyel özellikleri kökler ve bunları n başlı ca biyoaktif bileşenleri. Gıda Kimyası 109, 530-537. doi: 10.1016/j.foodchem.2007.12.064

Shapiro ED. Lyme hastalığı . N Engl J Med. 2014; 370:1724-31.

Sharma B, Brown AV, Matluck NE, Hu LT, Lewis K. Borrelia burgdorferi, etken madde

JAMES SCHALLER, MD, MAR ve KIMBERLY MOUNTJOY, MS

Lyme hastalığı ilaca dayanıklı kalıcı hücreler oluşturur.
Antimikrob Ajanlar Kemoterapi. 2015;59:4616–24.

Singh O, Khanam Z, Misra N, Srivastava MK.

Papatya (*Matricaria chamomilla* L.): Genel bir bakış.
Appl Microbiol Biyoteknoloji. 2010;85:1629–42.

Smith-Palmer A, Stewart J, Fyfe L. Bitkisel esansiyel yağların
ve esanslarındaki beş önemli grupta kaynaklı patojene karşı
antimikrobiyal özellikleri. Lett Appl Microbiol. 1998;26:118–22.

Straubinger RK, Summers BA, Chang YF, Appel MJ.

Borrelia burgdorferi'nin deneysel olarak enfekte olmuş
köpeklerde antibiyotik tedavisinden sonra kalıcı iltihabı.
Clin Microbiol. 1997;35:111–6.

Sun CQ, O'Connor CJ, Robertson AM. Yağ asitleri ve
monogliseritlerin *helicobacter pylori*'ye karşı antibakteriyel
etkileri. FEMS Immunol Med Microbiol. 2003;36:9–17.

Suriyo T, Pholphana N, Ungtrakul T, Rangkadilok N, Panomvana
D, Thiantanawat A, Pongpun W, Satayavivad J. Sağlıklı
Taylandlı Deneklerde Standartlaştırılmış *Andrographis*
paniculata Kapsülünün Çoklu Oral Doz Uygulamasının

Ardından Klinik Parametreler. Planta Med. 2017

Haz;83(9):778-789. doi: 10.1055/s-0043-104382. Epub 2017 1
Mart. PMID: 28249303.

LYME, BABESIA VE BARTONELLA'YI ÖLDÜRMEK İÇİN BİTKİLER VE ESAS YAĞLAR

Tanaka M, Kishimoto Y, Sasaki M, Sato A, Kamiya T, Kondo K, Iida K. *Terminalia bellirica* (Gaertn.) Roxb.

LPS Kaynaklı Ekstrakt ve Gallik Asit Zayıflatıyor

MAPK/NF- κ B Yoluyla İnflamasyon ve Oksidatif Stres

ve Akt/AMPK/Nrf2 Yolları. Oksit Med Hücresi Longev.

8 Kasım 2018;2018:9364364. doi: 10.1155/2018/9364364.

PMID: 30533177; PMCID: PMC6250009.

Tang T, Targan SR, Li ZS, Xu C, Byers VS, Sandborn WJ. Randomize klinik çalışması: aktif ülseratif kolitte bitkisel ekstrakt HMPL 004

- sürekli salınımli mesalazin ile çift kör bir karşılaştırma.

Besin Farmakol

Orada. 2011 Ocak;33(2):194-202. doi: 10.1111/j.1365-

2036.2010.04515.x. Epub 2010 30 Kasım. PMID: 21114791.

Theophilus PA, Victoria MJ, Socarras KM, Filush KR, Gupta K, Luecke DF, Sapi E. *Stevia Rebaudiana* tam yaprak ekstraktı'nın *Borrelia Burgdorferi*'nin çeşitli morfolojik formlarına karşı in vitro etkinliği.

Eur J Mikrobiol İmmünol. (Bp). 2015;5:268-80.

Thormar H, Hilmarsson H. Mikrobisidal lipidlerin patojenlere karşı konakçı savunmasındaki rolüne bunların terapötik ajanlar olarak potansiyelleri. Chem Phys Lipidleri. 2007;150:1-11.

Tisserand R, Young R. Esansiyel Yağ Güvenliği. Birleşik Krallık: Churchill Livingstone Elsevier; 2013.

JAMES SCHALLER, MD, MAR ve KIMBERLY MOUNTJOY, MS

Trinh NT, Dumas E, Thanh ML, Degraeve P, Ben Amara C, Gharsallaoui A, Oulahal N. Vietnam *Cinnamomum cassia* esansiyel yağ ı ve ana bileşeni trans-sinnamealdehitin hücre canlı lı ğ ı , membran bütünlüğü membran akı şkanlı ğ ı ve proton üzerindeki etkisi *Listeria innocua*'nın itici gücü. *Can J Microbiol.* 2015;61:263–71.

Vojdani A, Erde J. Düzenleyici T Hücreleri, CAM Araştı rmacı ları için Güçlü Bir İ mmün Düzenleyici Hedef: Tümör Bağ ı şı klı ğ ı nı n, Otoimmünitenin ve Alloreaktif Bağ ı şı klı ğ ı n Modüle Edilmesi (III). *Kanı ta Dayalı Tamamlayıcı Alternatif Med.* 2006 Eylül; 3(3): 309–316. 5 Temmuz 2006'da çevrimiçi yayı nlandı . doi: 10.1093/ecam/nel047. PMID: PMC1513145.

Vojdani A, Hebroni F, Raphael Y, Erde J, Raxlen B. Lyme Hastalı ğ ı nı n Yeni Tanı sı : CAM Müdahalesi Potansiyeli. *Kanı ta Dayalı Tamamlayıcı Alternatif Med.* 2009 Eylül; 6(3): 283–295. Çevrimiçi olarak 15 Ekim 2007'de yayı nlandı . doi: 10.1093/ecam/nem138. PMID: PMC2722197.

Wang M, Firman J, Zhang L, Arango-Argoty G, Tomasula P, Liu L, Xiao W, Yam K. Apigenin Bağ ı rsak Mikrobiyotası nı n Büyümesini Etkiler ve *Enterococcus*'un Gen İ fadesini Değ iştirir. *Moleküler.* 2017 Ağ u 3;22(8):1292. doi: 10.3390/moleküler22081292. PMID: 28771188; PMID: PMC6152273.

Willcox M, Bodeke G, Rasoanalvo P, Addae Kyereme J (eds). Geleneksel Şifalı Bitkiler ve Sıtma (Modern Zamanların Geleneksel Bitkisel İlaçları) 1. Baskı. CRC Basın. 2004

Wińska K, Maćzka W, Łyczko J, Grabarczyk M, Czubaszek A, Szumny A. Antimikrobiyal Ajanlar Olarak Esansiyel Yağlar-Efsane mi, Gerçek Alternatif mi? Moleküler. 2019 Haziran 5;24(11):2130. doi: 10.3390/molecules24112130. PMID: 31195752; PMCID: PMC6612361.

Xue C, Chen Y, Hu DN, Iacob C, Lu C, Huang Z. Chrysin, intrinsik apoptoz yoluyla insan uveal melanom hücrelerinde hücre apoptozunu indükler. Oncol Lett. 2016 Aralık;12(6):4813-4820. doi: 10.3892/ol.2016.5251. Epub 2016 13 Ekim. PMID: 28105189; PMCID: PMC5228444.

Yousef RT, Tawil GG. Uçucu yağların antimikrobiyal aktivitesi. Pharmazie. 1980;35:698-701.

Zalegh I, Akssira M, Bourhia M, Mellouki F, Rhallabi N, Salamatullah AM, Alkaltham MS, Khalil Alyahya H, Mhand RA. Cistus sp.: Fitokimyasal ve Antimikrobiyal Faaliyetler Üzerine Bir İnceleme. Bitkiler (Basel). 2021 15 Haziran;10(6):1214. doi: 10.3390/plants10061214. PMID: 34203720; PMCID: PMC8232106.

Zhang H, Li C, Kwok ST, Zhang QW, Chan SW. Kurutulmuş Bitkinin Farmakolojik Etkilerine İlişkin Bir İnceleme

JAMES SCHALLER, MD, MAR ve KIMBERLY MOUNTJOY, MS

Polygonum cuspidatum'un (Hu Zhang) Köküve Bileşenleri.
Kanı ta Dayalı Tamamlayıcı Alternatif Med.
2013;2013:208349. doi: 10.1155/2013/208349.
Epub 2013 30 Eylül. PMID: 24194779; PMCID: PMC3806114.
(Hidavi)

Zhang H, Li S, Si Y, Xu H. Andrographolide ve türevleri:
Güncel başarı lar ve gelecek perspektifleri. Eur J Med
Kimya. 15 Kasım 2021;224:
113710. doi: 10.1016/j.ejmech.2021.113710. Epub 2021
20 Temmuz. PMID: 34315039.

Zhang Q, Zhao JJ, Xu J, Feng F, Qu W. Uncaria cinsinin
tıbbi kullanımları , fitokimyası ve farmakolojisi . J
Etnofarmakol. 2015 Eylül 15;173:48-80. doi: 10.1016/
j.jep.2015.06.011. Epub 2015 17 Haziran.
PMID: 26091967.

Zhang QC, Zhang Y. Lyme Hastalığı ve Modern Çin
Tıbbı . Çin-Med Araştırma Enstitüsü New York, NY. 1
Mart 2006.

Zhang Y, Alvarez-Manzo H, Leone J, Schweig S ve Zhang Y.
(2021)Botanik İlaçlar Cryptolepis sanguinolenta,
Artemisia annua, Scutellaria baicalensis,
Polygonumcuspidatum ve Alchornea cordifolia
Babesia duncani'ye Karşı Engelleyici Aktivite Gösterin .
Ön. Hücre. Bulaştırma. Mikrobiyol. 11:624745.
doi: 10.3389/fcimb.2021.624745

Zhang Y, Bai C, Shi W, Alvarez-Manzo H, Zhang Y. Babesia duncani'ye karşı Yüksek Aktiviteye Sahip Sarı msak Yağı ve Karabiber Yağı İçeren Esansiyel Yağ ları n Tanı mlanması . Patojenler. 2020 Haziran 12;9(6):466. doi: 10.3390/patojenler9060466. PMID: 32545549; PMCID: PMC7350376.

Zhou YX, Zhang H, Peng C. Puerarin: farmakolojik etkilerin gözden geçirilmesi. Fitother Res. 2014 Temmuz;28(7):961-75. doi: 10.1002/ptr.5083. Epub 2013 13 Aralık. PMID: 24339367.

